

Bulletin de Santé du Végétal des Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures (JEVI)

LA SANTE DES JARDINS ET ESPACES VERTS

N°06 – 24/09/2026

Financé par



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité



PRÉFET
DE LA RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE

Liberté
Égalité
Fraternité

Retrouvez gratuitement
les BSV sur le site de la
[DRAAF Hauts-de-France](#)



FREDON
HAUTS-DE-FRANCE

Retrouvez gratuitement le
BSV JEVI sur le site de
[FREDON Hauts-de-France](#)

A RETENIR :

ACTUALITÉS :

- Colloque sur les produits phytopharmaceutiques.
- Webinaire sur le chancre coloré du platane.

A SURVEILLER ... :

- La présence de la pyrale du buis touche à sa fin, pensez à mettre en place les mesures prophylactiques durant l'automne/hiver.
- Les conditions météorologiques des ces dernières semaines sont défavorables aux maladies dans les gazons.
- Quelques cas de bioagresseurs d'importance pour la santé des JEVI recensés.

ZOOM SUR... Le scolyte des pousses du noyer (*Pityophthorus juglandis*)

Retrouvez l'ensemble des bulletins parus [sur le site de la DRAAF](#).

REJOIGNEZ LE RÉSEAU D'OBSERVATEURS DU BULLETIN JEVI

Le contenu des Bulletins est basé sur les informations biologiques et épidémiologiques issues d'un réseau d'observateurs, animé par un animateur régional, rédacteur du Bulletin. Plus les observateurs sont nombreux et bien répartis sur le territoire, plus le Bulletin donne une image précise et fiable de la santé des végétaux dans les différents espaces végétalisés (parcs et jardins publics, jardins historiques, terrains de sport, infrastructures, etc.).

Rejoignez le réseau et participez à l'enrichissement des BSV JEVI tout en renforçant vos connaissances en santé et protection des végétaux !

Inscrivez-vous en remplissant le formulaire



Identifiez les cibles de produits de biocontrôles grâce à ce logo



Identifiez les résistances de bioagresseurs à des produits phytopharmaceutiques (PPP)



ACTUALITÉS

Colloque Ecophyto – Produits phytopharmaceutiques

Le 22 octobre prochain se tiendra un colloque sur le thème « de l'exposition aux impacts sur la santé humaine et les écosystèmes vers une approche intégrée "une seule santé" » à Paris. Plus d'informations en suivant [ce lien](#).

Biocontrôle

La dernière mise à jour de la liste des produits de biocontrôle est accessible en suivant [ce lien](#) (mise à jour le 24/07/2026).

Webinaire FREDON – Chancre coloré du platane

Pour en savoir plus sur cette maladie, les mesures de prévention et les retours d'expérience, consultez le replay du webinaire organisé par la DRIAAF Île-de-France et FREDON Île-de-France : [lien du replay](#).



JARDINS PAYSAGERS

Buis

Pyrale du buis (*Cydalima perspectalis*)

Des chenilles ont été observées ces dernières semaines dans le secteur de Hallennes-lez-Haubourdin (59). Les dégâts causés par ce ravageur persistent toujours dans le Parc du lycée agricole de la Baie de Somme à Abbeville (80). Des pyrales du buis (papillons/chenilles) peuvent être observées en activité jusqu'en octobre/novembre, mois à partir duquel les jeunes chenilles vont entrer en diapause.

De plus amples informations se trouvent dans le BSV JEVI Hauts-de-France n°1 de 2025, dans la partie [ZOOM SUR ... La pyrale du buis](#).



Les chenilles passent l'hiver « dans un cocon de soie collé entre deux feuilles de buis »

(Crédits photographiques : [Ephytia](#))

Quelques précautions à prendre pour limiter l'infestation l'année prochaine ... :

- Les pièges à phéromones peuvent d'ores et déjà être retirés ;
- Ramassez puis exportez les feuilles tombées à l'automne, ou les broyer avant de les composter ;
- En cas de forte attaque sur vos buis, il est préférable d'éviter une taille sévère ;
- Pour les buis peu attaqués, il est conseillé de les tailler dans l'objectif qu'ils soient aérés ;
- Dès le mois de février, surveillez vos buis, notamment à l'intérieur du buisson, pour détecter les premières chenilles et les détruire manuellement ou grâce aux substances de biocontrôle ;
- Favorisez l'installation des oiseaux (mésanges, notamment) près des buis.



Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour ce ravageur. Il s'agit des substances actives suivantes : *Bacillus thuringiensis*, huile essentielle d'orange, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (aldéhydes). Retrouvez la liste actualisée des produits de biocontrôle sur le site :

<https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole>

Rosiers

Des symptômes de la maladie des taches noires sont signalés dans le Parc du lycée horticole de Lomme (59).



Maladie des taches noires sur rosier

(Crédits photographiques : F.DUMOULIN - Archives)

Financé par



GAZONS

Dollar spot

Des symptômes de dollar spot ont été observés au sein du Golf du Lys Chantilly à Lamorlaye (60). L'impact de la maladie est faible. Aucun symptôme n'a été détecté au sein de l'AA Golf de Saint-Omer à Lumbres (62).

Les conditions favorables au développement de la maladie sont des températures élevées le jour (20-30°C) et plus faibles la nuit, créant des rosées matinales. Ainsi qu'une humidité élevée. Restez vigilants !



Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cette maladie.

Il s'agit des substances actives suivantes : soufre, phosphonates de potassium.

Retrouvez la liste actualisée des produits de biocontrôle sur le site :

<https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle>

Rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)

Des symptômes assez présents de rhizoctone sont visibles depuis juin au sein du Golf du Lys Chantilly à Lamorlaye (60). Cette maladie est favorisée par des températures élevées et un excès d'humidité. La décompaction du sol peut défavoriser cette maladie.



Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cette maladie.

Il s'agit de la substance active suivante : soufre.

Retrouvez la liste actualisée des produits de biocontrôle sur le site :

<https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle>

Basidiomycètes

L'humidité élevée observée ces dernières semaines a favorisé le développement des basidiomycètes au sein de l'AA Golf de Saint-Omer à Lumbres (62). Ce groupe rassemble la plupart des champignons à chapeau, parmi lesquels figurent notamment les espèces responsables des ronds de sorcière.



Rond de sorcière des gazons

(Crédits photographiques : [Ephytia](#))

Larves

Des larves de charançons et de hannetons ont été détectées lors de travaux de sol dans le Parc du Domaine de Chantilly (60).

Des vers blancs sont observés dans le secteur de Hallennes-lez-Haubourdin (59).

Des adultes de tipules ont été observés au sein de l'AA Golf de Saint-Omer à Lumbres (62) et du Parc "Hill 70 Mémorial" de Loos-en-Gohelle (62). Les larves devraient apparaître dans 3 à 4 semaines.

Les précipitations et les conditions froides sont défavorables à ces larves.

Des mesures prophylactiques et des méthodes de lutte peuvent être appliquées pour lutter contre ces larves : aérer le sol ; travailler le sol ; favoriser les auxiliaires (merles, étourneaux, batraciens, hérissons, chauve-souris, etc.) ; etc.



Tipule adulte

(Crédits photographiques : FREDON HdF)

Financé par



ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT

Erable

Maladie de la suie (*Cryptostroma corticale*)

Des symptômes de la maladie de la suie ont été observés dans le Parc du Domaine de Chantilly (60), sur érable sycomore.

Maladie des taches noires

Les symptômes de la maladie des taches noires sont de nouveau plus importants que le mois dernier sur érables dans le Parc "Hill 70 Mémorial" de Loos-en-Gohelle (62) et dans le Parc du lycée horticole de Lomme (59). Cette maladie ne met pas en danger la vie de l'arbre.



Symptômes de la maladie des taches noires


(Crédits photographiques : FREDON HdF)

Frêne

Chalarose du frêne (*Chalara fraxinea*)

Dix nouveaux sujets sont morts récemment dans le Parc du Domaine de Chantilly (60) en raison de cette maladie. Dans le Parc du lycée agricole de la Baie de Somme à Abbeville (80), un grand frêne est particulièrement touché par la maladie.

Il est recommandé d'être attentif aux branches contaminées par le champignon. Fragilisées, elles peuvent tomber sur des espaces fréquentés par des promeneurs. En prévention, il convient de couper ces branches et de bien désinfecter les outils de coupe pour éviter de propager le champignon sur des rameaux sains. Si l'arbre doit être abattu, il est conseillé de le remplacer par une essence différente.



Cycle de vie du champignon responsable de la chalarose du frêne

(Crédits photographiques : Véronique Gavalda)

Marronnier

Mineuse du marronnier (*Cameraria ohridella*)

Les mines de mineuses du marronnier sont toujours visibles sur des marronniers dans le Parc du Domaine de Chantilly (60), dans le Parc du lycée horticole de Lomme (59) et dans le Parc "Hill 70 Mémorial" de Loos-en-Gohelle (62). Sur ce dernier site, de nouvelles mines sont apparues depuis le mois dernier. La mineuse du marronnier effectue son cycle en 3 générations.

La description, l'impact de ce ravageur ainsi que les moyens de lutte possibles sont décrits dans [cet article](#).

Chancre bactérien du marronnier (*Pseudomonas syringae*)

Des symptômes du chancre bactérien du marronnier (ou dépérissement bactérien du marronnier) sont signalés dans le Parc du Domaine de Chantilly (60) et dans le Parc du lycée horticole de Lomme (59).

Pour en apprendre plus sur cette maladie, suivez [ce lien](#).

Financé par



OBSERVATIONS PONCTUELLES

Stress hydrique et thermique

Les arbres et arbustes restent marqués par les brulures et le stress hydrique de cet été, d'après les observations réalisées dans le secteur de Hallennes-lez-Haubourdin (59) et dans le Parc "Hill 70 Mémorial" de Loos-en-Gohelle (62).

Oïdium

Des symptômes d'oïdium sont toujours observés dans le Parc "Hill 70 Mémorial" de Loos-en-Gohelle (62) sur amélanchier, charme, prunus.



Brulures sur Cornus

(Crédits photographiques : FREDON HdF)



Symptômes d'oïdium

(Crédits photographiques : FREDON HdF)



Pucerons

La pression pucerons a beaucoup diminué depuis le mois dernier sur les différentes essences du Parc "Hill 70 Mémorial" de Loos-en-Gohelle (62). Seuls quelques individus ont été observés sur cornus.

Phytopte

Des galles de phytopte du tilleul ont été détectées sur quelques sujets du Parc "Hill 70 Mémorial" de Loos-en-Gohelle (62). Ces acariens ne compromettent pas la pérennité de l'arbre.

Gendarmes

Des pyrrhocores (communément appelés « Gendarmes ») ont été observés sur noisetier dans le Parc "Hill 70 Mémorial" de Loos-en-Gohelle (62). Cet insecte se nourrit de graines de tilleul, de cadavres d'insectes et de pucerons, notamment.



Pyrrhocores ou gendarmes

(Crédits photographiques : FREDON HdF)



Galles de phytopte du tilleul



ZOOM SUR ...

Le scolyte des pousses du noyer (*Pityophthorus juglandis*)



Organisme de Quarantaine (OQ)

En bref ...

- Le scolyte des pousses du noyer est responsable de la maladie des mille chancres du noyer (*Geosmithia morbida*).
- Principales plantes hôtes dans les Hauts-de-France : noyer noir d'Amérique, noyer hybride, noyer commun.

Où se situent-ils et quelles conséquences ?

- L'association de la présence du scolyte des pousses du noyer et de la maladie des mille chancres du noyer peut entraîner le dépérissement progressif de l'arbre puis sa mort en quelques années.
- Ravageur et maladie présents aux Etats-Unis où ils causent une mortalité massive des noyers dans certaines régions.
- En Europe, le scolyte *Pityophthorus juglandis* et la maladie des mille chancres sont présents en Italie depuis 2013, où leur répartition reste limitée. En France, ils ont été détectés pour la première fois en 2022 en Auvergne-Rhône-Alpes et n'ont depuis été signalés que ponctuellement dans cette région.

Comment les reconnaître ?

Le scolyte

Taille : 1,5 à 2 mm de long.
Couleur : brun-rougeâtre.
Leur présence peut être détectée par de petits trous à la surface de l'écorce.



Adulte de *Pityophthorus juglandis*
(Crédits : Steven Valley)

La maladie

Sous l'écorce, autour des orifices créés par les scolytes, présence d'une tache noire humide (chancre) caractéristique.



Symptômes de la présence du scolyte des pousses du noyer
(Crédits : Gary Bernon)

Les symptômes

Jaunissement puis flétrissement du feuillage, s'en suit un dépérissement de la branche infectée et un rétrécissement de la couronne.



Symptômes de la maladie des mille chancres du noyer et de la présence du scolyte des pousses du noyer
(Crédits : Troy Kimoto ; Mary Ann Hansen)



Confusions possibles

La présence de trous sur l'écorce n'est pas suffisante pour identifier la présence du scolyte des pousses du noyer. De nombreuses autres espèces de scolytes peu problématiques peuvent être responsables de ces orifices. La présence du chancre noir sous l'écorce, autour de l'orifice est un critère essentiel pour diagnostiquer la maladie des mille chancres.

Où trouver plus d'informations ?

- [Note nationale BSV rédigée par la DGAL.](#)



Que faire en cas de suspicion ?



Toute personne qui constate ou suspecte la présence du scolyte des pousses du noyer et/ou de la maladie des mille chancres sur des végétaux est tenue d'en faire la déclaration auprès de la DRAAF/SRAL Hauts-de-France.

Courriel : sante-des-vegetaux.draaf-hauts-de-france@agriculture.gouv.fr

Site de Lille - tel : 03 62 28 41 08

Site d'Amiens - tel : 03 22 33 55 97

Financé par



PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Berce du Caucase (*Heracleum mantegazzianum*)

Il convient de rester vigilant en cas de proximité des plantes de berce du Caucase avec le public.

Aucune repousse n'a été observée sur les pieds débroussaillés en juin dans le parc du lycée horticole de Lomme (59).

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique réalisée par FREDON Hauts-de-France : [lien](#).



CETTE PLANTE PEUT PROVOQUER DES BRULURES, NOTAMMENT.



Berce du Caucase - Archives

(Crédits photographiques : Verger Grande-Synthe)



AUXILIAIRES

Les auxiliaires sont difficiles à observer dans le Parc "Hill 70 Mémorial" de Loos-en-Gohelle (62). Seules des araignées ont été détectées lors des observations.



Araignée

(Crédits photographiques : FREDON HdF)

Ce bulletin est publié à partir d'observations ponctuelles ou régulières réalisées par un réseau d'épidémiosurveillance en jardins, espaces végétalisés et infrastructures (JEVI). S'il donne une tendance de la situation phytosanitaire régionale la plus représentative et objective possible, il reste nécessaire pour chaque gestionnaire de JEVI de considérer également le résultat de ses propres observations. Les informations contenues dans ce bulletin ne peuvent être transposées telles quelles à d'autres situations. Elles permettent de donner des tendances d'évolutions phytosanitaires à l'échelle de petites régions. FREDON Hauts-de-France dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les gestionnaires d'espaces verts, jardiniers amateurs ou tout autres détenteurs de végétaux sur la base des informations communiquées dans ce bulletin.

Observations : Aa Golf de Saint-Omer, Golf du Lys Chantilly, Domaine de Chantilly, Jardinerie France rurale, Lycée professionnel agricole de la Baie de Somme, Lycée horticole de Lomme, FREDON Hauts-de-France.

Rédaction et animation : FREDON Hauts-de-France

Directeur de la publication : Paul MENNECIER, Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt des Hauts-de-France.

Reproduction intégrale de ce bulletin autorisée.

Coordination et renseignements : Marie BERNARD, marie.bernard@fredon-hdf.fr

Reproduction partielle autorisée avec la mention « Extrait du BSV JEVI en Hauts-de-France n°06 du 24/09/2026 »

Financé par



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité

Bulletin de Santé du Végétal Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures
Région Hauts-de-France
BSV n°06 du 24 septembre 2026