



SOMMAIRE

Pépins : Pommes – Poires

Ravageurs

Carpocapse : Captures localement importantes, conditions relativement favorables aux accouplements selon les secteurs, nouvelles éclosions, retard dans les prévisions des nouvelles éclosions.

Petite tordeuse des fruits : Captures localement significatives.

Eulia : Faibles captures.

Capua : Faibles captures.

Pandemis : Diminution des captures.

Tordeuse rouge des bourgeons : Faibles captures.

Tordeuse verte des bourgeons : Captures localement importantes.

Sésie : Captures localement importantes.

Zeuzère : Nouvelles captures.

Cossus gâte-bois : Aucune capture.

Puceron cendré : Populations observées sur la majorité des secteurs.

Puceron lanigère : Faible pression.

Pathologies

Oïdium : Pression localement en hausse.

Tavelure : Vers la fin des contaminations primaires, nouvelles périodes de contamination, nouvelles sorties de taches.

Noyaux : Prunes – Cerises

Ravageurs

Carpocapse des prunes : Nouvelles captures.

Mouche de la cerise : Augmentation des captures.



Crédit photographique FREDON Hauts-de-France

Ravageurs

Carpocapse (*Cydia pomonella*)

Carpocapse adulte

Etat des lieux en parcelle :


- Captures dans les secteurs **Flandre Maritime, La Bassée, Montreuillois, Hainaut, Abbevillois, Avesnois, Soissonnais et Arrageois** ;
- Captures **de 0 à 5 individus** ;
- **53% des parcelles** du réseau concernées.

Analyses des risques :

- Dépassement du seuil indicatif de risque dans les secteurs **Flandre Maritime, Montreuillois, Hainaut, Arrageois, Avesnois, Soissonnais et La Bassée**.

Gestion des risques :

- Les diffuseurs doivent être mis en place dans les jours à venir pour les parcelles en protection par confusion sexuelle ;
- Les pièges à phéromone doivent être installés en parcelles.



Seuil indicatif de risque :

- 3 captures / semaine / 1 piège sur 1 ha ;
- 4 captures / semaine / 1 piège sur 2 ha ;
- 5 captures / semaine / 1 piège sur 3 ha ;
- 6 captures / semaine / 1 piège sur 4 ha.

Accouplements



Etat des lieux en parcelle :

- Températures enregistrées au cours de la semaine parfois insuffisantes pour les accouplements ;
- Accouplements possibles dans la majorité des secteurs ;
- Période de référence sélectionnée : **7 et 8 juin**.

Analyses des risques :

- Au cours de la semaine passée les secteurs présentant des populations dépassant le seuil indicatif de risque sont : **Flandre Maritime, Montreuillois, Hainaut, Arrageois, Avesnois, Soissonnais et La Bassée**.

Gestion des risques :

- Les pièges à phéromone doivent être installés et relevés régulièrement afin de comparer les captures aux conditions accouplements.

Accouplements possibles Accouplements potentiels (conditions limites)	04/06/2024	05/06/2024	06/06/2024	07/06/2024	08/06/2024	09/06/2024	10/06/2024
Flandre Maritime (59)							
Flandre Intérieure (59-62)							
Lille Sud (59)							
Montreuillois (62)							
La Bassée (59)							
Hainaut (59)							
Abbevillois (80-62)							
Arrageois (62)							
Cambrésis (59)							
Avesnois (59)							
Amiénois (80)							
Thiérache (59-02)							
Picardie Verte (80-60)							
Neslois (80-60-02)							
St Quentinnois (02)							
Laonnois (02)							
Montdidérien (80-60)							
Soissonnais (60-02)							
Senlisien (60)							
Omois (02)							

Seuil indicatif de risque :

- Conditions d'accouplements : températures et hygrométrie crépusculaires suffisantes réunies durant 2 jours consécutifs.

Biocontrôle :

- Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage ;
- Retrouvez la liste des produits en cliquant sur le logo suivant :



DNA : données non accessibles, problème technique / DNE : données non évaluables



Etat des lieux en parcelle :

- Les températures **n'ont pas favorisé** une **évolution rapide** des incubations en cours ;
- Les **pontes** issues de la **première période d'accouplement** sont désormais **écloses , certaines ont avorté ;**
- Les prochaines éclosions sont attendues plus tard que prévu, à partir du **12 juin**.

Gestion des risques :

- Il est important de suivre les pièges à phéromones afin d'identifier au mieux les périodes à risque ;
- Les prochains bulletins annonceront l'évolution des incubations.

	Périodes de pontes issues des accouplements			Date (prévisionnelle) de sortie des larves		Périodes de pontes issues des accouplements			Date (prévisionnelle) de sortie des larves
Flandre Maritime (59)	du 12-mai	au 13-mai		8-juin	Amiénois (80)	du 12-mai	au 13-mai		Avortement
	du 25-mai	au 26-mai		19-juin		du 19-mai	au 20-mai		17-juin
	du 03-juin	au 4-juin		23-juin		du 25-mai	au 26-mai		20-juin
Flandre Intérieure (59-62)	du 12-mai	au 13-mai		5-juin	Thiérache (59-02)	du 12-mai	au 13-mai		Avortement
	du 19-mai	au 20-mai		14-juin		du 19-mai	au 20-mai		18-juin
	du 25-mai	au 26-mai		18-juin		du 25-mai	au 26-mai		20-juin
Lille Sud (59)	du 12-mai	au 13-mai		4-juin	Picardie Verte (80-60)	du 12-mai	au 13-mai		08-juin
	du 19-mai	au 20-mai		14-juin		du 17-mai	au 18-mai		14-juin
	du 25-mai	au 26-mai		18-juin		du 25-mai	au 26-mai		19-juin
Montreuillois (62)	du 12-mai	au 13-mai		Avortement	Neslois (80-60-02)	du 12-mai	au 13-mai		5-juin
	du 18-mai	au 19-mai		17-juin		du 19-mai	au 20-mai		14-juin
	du 25-mai	au 26-mai		21-juin		du 25-mai	au 26-mai		18-juin
La Bassée (59)	du 19-mai	au 20-mai		12-juin	St Quentinnois (02)	du 12-mai	au 13-mai		08-juin
	du 25-mai	au 26-mai		18-juin		du 25-mai	au 26-mai		19-juin
	du 03-juin	au 4-juin		23-juin		du 03-juin	au 4-juin		22-juin
Hainaut (59)	du 12-mai	au 13-mai		5-juin	Laonnois (02)	du 12-mai	au 13-mai		7-juin
	du 19-mai	au 20-mai		14-juin		du 19-mai	au 20-mai		15-juin
	du 25-mai	au 26-mai		18-juin		du 25-mai	au 26-mai		18-juin
Abbevillois (80-62)	du 12-mai	au 13-mai		5-juin	Montdidérien (80-60)	du 12-mai	au 13-mai		04-juin
	du 19-mai	au 20-mai		15-juin		du 19-mai	au 20-mai		14-juin
	du 25-mai	au 26-mai		18-juin		du 25-mai	au 26-mai		18-juin
Arrageois (62)	du 12-mai	au 13-mai		Avortement	Soissonnais (60-02)	du 12-mai	au 13-mai		07-juin
	du 19-mai	au 20-mai		17-juin		du 19-mai	au 20-mai		15-juin
	du 25-mai	au 26-mai		21-juin		du 25-mai	au 26-mai		20-juin
Cambrésis (59)	du 12-mai	au 13-mai		5-juin	Senlisien (60)	du 19-mai	au 20-mai		10-juin
	du 19-mai	au 20-mai		14-juin		du 25-mai	au 26-mai		18-juin
	du 25-mai	au 26-mai		18-juin		du 02-juin	au 3-juin		24-juin
Avesnois (59)	du 12-mai	au 13-mai		7-juin	Omois (02)	du 12-mai	au 13-mai		05-juin
	du 19-mai	au 20-mai		15-juin		du 19-mai	au 20-mai		13-juin
	du 25-mai	au 26-mai		19-juin		du 25-mai	au 26-mai		17-juin

IC : Incubation en cours : délai prévisionnel supérieur aux prévisions
 AP : Avortement Probable : délai d'incubation supérieur au maxima biologique

Retrouvez toutes les explications des tableaux carpocapse dans la fiche « OAD : Modèle Carpocapse DGAL-Onpv Carpocapse des pommes et des poires *Cydia pomonella* » ou en suivant [ce lien](#).

Biocontrôle :

- Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage ;
- Retrouvez la liste des produits en cliquant sur le logo suivant :





Petite tordeuse des fruits adulte

Etat des lieux en parcelle :

- **Captures** dans les secteurs du **Hainaut et de l'Avesnois** ;
- Captures de **0 à 14 individus** ;
- **21% des parcelles** du réseau concernées.


Analyses des risques :

- Captures localement significatives.

Gestion des risques :

- Les diffuseurs doivent être mis en place dans les jours à venir pour les parcelles en protection par confusion sexuelle ;
- Les pièges à phéromone doivent impérativement être installés en parcelles.

Evolution des captures hebdomadaires de petite tordeuse des fruits sur les 5 dernières semaines



Seuil indicatif de risque :

Il n'existe pas à ce jour en France un seuil validé pour ce ravageur.

Biocontrôle :

- Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage ;
- Retrouvez la liste des produits en cliquant sur le logo suivant :





Eulia

Etat des lieux en parcelle :

- **Captures** dans le secteur **Montreuillois** ;
- Captures **de 0 à 1 individus** ;
- **7% des parcelles** du réseau concernées.


Analyses des risques :

- Faibles captures.

Gestion des risques :

- Les diffuseurs doivent être mis en place dans les jours à venir pour les parcelles en protection par confusion sexuelle ;
- Les pièges à phéromone doivent être installés en parcelles.

Evolution des captures hebdomadaires d'Eulia sur les 5 dernières semaines



Seuil indicatif de risque :

Aucun seuil n'est validé en France pour le premier vol.

Biocontrôle :

- Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage ;
- Retrouvez la liste des produits en cliquant sur le logo suivant :





Capua

Etat des lieux en parcelle :


- **Captures** dans le secteur du **Hainaut** ;
- Captures **de 0 à 5 individus** ;
- **9% des parcelles** du réseau concernées.

Analyses des risques :

- Aucun dépassement du seuil indicatif de risque.

Gestion des risques :

- Les diffuseurs doivent être mis en place dans les jours à venir pour les parcelles en protection par confusion sexuelle ;
- Les pièges à phéromone doivent être installés en parcelles.



Seuil indicatif de risque :

40 captures sur une durée de 7 jours.

Biocontrôle :

- Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage ;
- Retrouvez la liste des produits en cliquant sur le logo suivant :





Pandemis adulte

Etat des lieux en parcelle :


- Captures dans les secteurs **La Bassée, Abbevillois et Arrageois.**
- Captures **de 0 à 20 individus ;**
- **50% des parcelles** du réseau concernées.

Analyses des risques :

- Aucun dépassement du seuil indicatif de risque.

Gestion des risques :

- Les diffuseurs doivent être mis en place dans les jours à venir pour les parcelles en protection par confusion sexuelle ;
- Les pièges à phéromone doivent impérativement être installés en parcelles.



Seuil indicatif de risque :

50 captures cumulées dans les 18 jours suivant la capture du premier papillon.

Biocontrôle :

Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage.



Tordeuse rouge des bourgeons



Etat des lieux en parcelle :


- Capture dans les secteurs **Montreuillois et La Bassée.**
- Captures **de 0 à 2 individus ;**
- **25% des parcelles.**

Analyses des risques :

- Faibles captures.

Gestion des risques :

- Les pièges à phéromone doivent être installés en parcelles.



Seuil indicatif de risque :

Il est fixé à 8% d'organes touchés pour l'ensemble des chenilles, lors du printemps de l'année suivante. Ce seuil s'établit sur base d'observations à réaliser sur un échantillon représentatif de 100 pousses à raison de 2 pousses sur 50 arbres.

Biocontrôle :

Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage.



Tordeuse verte des bourgeons



Etat des lieux en parcelle :


- Capture dans les secteurs **Avesnois, La Bassée et Thiérache.**
- Captures **de 0 à 41 individus ;**
- **57% des parcelles** du réseau concernées.

Analyses des risques :

- **Captures localement importantes.**

Gestion des risques :

- Les pièges à phéromone doivent être installés en parcelles.



Seuil indicatif de risque :

Il est fixé à 8% d'organes touchés pour l'ensemble des chenilles, lors du printemps de l'année suivante. Ce seuil s'établit sur base d'observations à réaliser sur un échantillon représentatif de 100 pousses à raison de 2 pousses sur 50 arbres.

Biocontrôle :

Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage.





Sésie du pommier adulte

Etat des lieux en parcelle :

- Captures dans les secteurs **Flandre Maritime, Abbevillois, Hainaut et Arrageois** ;
- Captures de **0 à 88 individus** ;
- **44% des parcelles.**


Analyses des risques :

- **Captures localement importantes** : 88 individus piégés dans le secteur de l'Abbevillois ;
- Il est nécessaire de suivre l'évolution des populations via le piégeage.

Gestion des risques :

- Pensez à installer, les pièges alimentaires dans les parcelles dès les premières captures ;
- Pour rappel : 85% d'eau + 10% de vin rouge + 5% de cassonade (*essais de piégeage massif réalisés en 2006 et 2007 par la FREDON HdF, cf. fiche technique disponible en ligne*).

Evolution des captures hebdomadaires de sésie du pommier sur les 5 dernières semaines



Seuil indicatif de risque :

- 50 dépouilles nymphales / 50 arbres en jeunes parcelles ;
- 200 à 400 dépouilles nymphales / 50 arbres en parcelles de plus de 7 ans.



Zeuzère adulte

Etat des lieux en parcelle :

- Captures dans les secteurs **Flandre Maritime et Montreuillois** ;
- Captures de **0 à 2 individus** ;
- **20% des parcelles**.


Analyses des risques :

- **Aucun dépassement du seuil** indicatif de risque.

Gestion des risques :

- Les diffuseurs doivent être mis en place dans les jours à venir pour les parcelles en protection par confusion sexuelle ;
- Les pièges à phéromone doivent être installés en parcelles.

Evolution des captures hebdomadaires de zeuzère sur les 5 dernières semaines



Seuil indicatif de risque :

- 10% de pousses terminales touchées pour 100 pousses observées sur 50 arbres.



Cossus adulte

Etat des lieux en parcelle :


- Aucune capture.

Analyses des risques :

- Pour les parcelles sensibles, le piégeage massif doit être mis en place.

Gestion des risques :

Dès les premiers signes d'infestation d'une parcelle, le piégeage massif (10p/ha) est relativement efficace.



Seuil indicatif de risque :

Il n'existe pas à ce jour de seuil validé en France.

Puceron cendré



Puceron cendré

Etat des lieux en parcelle :

Observation de puceron cendré sur pousse dans les secteurs **Flandre Maritime, Soissonnais, Avesnois, Montreuillois et Thiérache.**

Analyse des risques

Dépassement du seuil indicatif de risque dans les secteurs concernés par la présence du puceron.

Gestion des risques

- **Prendre en compte la présence de pollinisateurs** dans la gestion ;
- Vérifier la mention « Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles » ;
- Privilégier **la fin de la floraison** avant de mettre en œuvre la gestion.



Evolution de la colonisation par le puceron cendré sur pousse	4-juin	11-juin	Tendance /S-1
Flandre Maritime (59)	1,0	0,5	↘
Flandre Intérieure (59-62)		0,0	
Lille Sud (59)			
Montreuillois (62)	1,0	3,0	↗
La Bassée (59)			
Hainaut (59)	0,0	0,0	↔
Abbevillois (80-62)			
Arrageois (62)		0,0	
Cambrésis (59)			
Avesnois (59)		1,0	
Amiénois (80)			
Thiérache (59-02)	3,0	6,0	↗
Picardie Verte (80-60)			
Neslois (80-60-02)	5,0		
St Quentinnois (02)			
Laonnois (02)			
Montdidérien (80-60)			
Beauvaisis (60)			
Soissonnais (60-02)	10,0	5,0	↘
Senlisien (60)			
Omois (02)			

Seuil indicatif de risque :

1% (base de 100 pousses réparties à raison de 2 sur 50 arbres).

Puceron lanigère



Puceron lanigère

Etat des lieux en parcelle :

Observation de puceron lanigère sur pousse dans les secteurs **Flandre Maritime, Hainaut et Thiérache.**

Analyse des risques

- Pas de dépassement du seuil indicatif de risque.

Gestion des risques

- **Prendre en compte la présence de pollinisateurs** dans la gestion ;
- Vérifier la mention « Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles » ;
- Privilégier **la fin de la floraison** avant de mettre en œuvre la gestion.



Evolution de la colonisation par le puceron lanigère sur pousse	4-juin	11-juin	Tendance /S-1
Flandre Maritime (59)	1,0	1,0	↔
Flandre Intérieure (59-62)			
Lille Sud (59)			
Montreuillois (62)			
La Bassée (59)			
Hainaut (59)	0,0	2,0	↗
Abbevillois (80-62)			
Arrageois (62)		0,0	
Cambrésis (59)			
Avesnois (59)			
Amiénois (80)			
Thiérache (59-02)	1,0	1,0	↔
Picardie Verte (80-60)			
Neslois (80-60-02)			
St Quentinnois (02)			
Laonnois (02)			
Montdidérien (80-60)			
Beauvaisis (60)			
Soissonnais (60-02)			
Senlisien (60)			
Omois (02)			

Seuil indicatif de risque :

10% (base de 100 pousses réparties à raison de 2 sur 50 arbres).

Oïdium



Oïdium sur pousse

Etat des lieux en parcelle :

- Des **contaminations sur pousses** ont été constatées sur les secteurs **Montreuillois, Arrageois, Avesnois, Thiérache et Soissonnais** ;
- Observation de **0 à 20%** de pousses touchées ;
- **50%** des parcelles du réseau concernées.

Analyses des risques :

- **Dépassement du seuil indicatif de risque** dans les secteurs **Thiérache, Soissonnais et Avesnois**.

Gestion des risques :

- Les conditions **chaudes** et **faiblement pluvieuses** favorisent la maladie ;
- Cette problématique est à raisonner actuellement avec celle concernant la tavelure ;
- La mise en œuvre des mesures prophylactiques (coupe et export des pousses hors du verger) semble la meilleure technique actuellement pour limiter les risques de diffusion au sein du verger.

Evolution des contaminations sur pousse par l'Oïdium	4-juin	11-juin	Tendance /S-1
Flandre Maritime (59)	1,0	0,0	↘
Flandre Intérieure (59-62)		0,0	
Lille Sud (59)			
Montreuillois (62)	0,0	3,0	↗
La Bassée (59)			
Hainaut (59)	2,3	0,0	↘
Abbevilleois (80-62)			
Arrageois (62)		1,0	
Cambrésis (59)			
Avesnois (59)		20,0	
Amiénois (80)			
Thiérache (59-02)	5,0	5,0	↔
Picardie Verte (80-60)			
Neslois (80-60-02)			
St Quentinnois (02)			
Laonnois (02)			
Montdidérien (80-60)			
Beauvaisis (60)			
Soissonnais (60-02)	2,0	5,0	↗
Senlisien (60)			
Omois (02)			

Seuil indicatif de risque :

- 5% de pousses contaminées /100 pousses.

Biocontrôle :

- Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage ;
- Retrouvez la liste des produits en cliquant sur le logo suivant :





Tavelure sur feuille

Etat des lieux en parcelle :

- Les contaminations primaires touchent à leur fin ;
- Précipitations enregistrées sur la majorité des secteurs ;
- Les risques enregistrés sont **nuls à graves** ;
- Les **conditions** ont été **majoritairement peu favorables** à l'évolution des périodes de contamination.

Analyse des risques :

Les **quantités d'eau** enregistrées durant les **dernières périodes de contaminations** vont de 0,2mm à 11,6mm pour une moyenne régionale de **2,29mm**.

Selon la modélisation, les **stocks projetables** sont à ce jour de **0,06% en moyenne**, variant selon les secteurs de 0% à 0,97%.

Toujours selon la modélisation, au cours des dernières périodes de contaminations, les **taux de projections** sont de **0,16% en moyenne**, variant selon les secteurs de 0% à 1,39%.

Prévisions de Météo France :

- Températures douces ;
- Précipitations annoncées dans les jours à venir.

Gestion des risques :

Pensez à coupler votre gestion des risques avec celle contre l'oïdium.

Le **tableau** en page suivante résume les **situations actualisées** et **prévisionnelles** selon les **secteurs géographiques** (données issues de la modélisation et des réseaux agrométéorologiques). Les données sont issues de la modélisation sur base de données de stations météorologiques sur une commune précise de chaque secteur. Cette situation peut différer.

Biocontrôle :

- Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage ;
- Retrouvez la liste des produits en cliquant sur le logo suivant :



Tavelure - Modélisation

Zones géographiques	Début de période	Fin de période	Risque associé pour le moment	% d'ascospores projetées		Stock d'ascospores projetables pour le moment	Précipitations associées à cette période pour le moment en mm	Somme des degrés heures depuis le début de la période jusqu'à 11h ce jour			
				associées à cette période pour le moment	depuis début contaminations primaires selon la modélisation de ce jour						
Flandre Maritime (59)	05-juin 2 h	05-juin 7 h	Nul	0,59	100,00	0,00	1,4	325			
	10-juin 6 h	10-juin 17 h	Très léger	0,00			7,8				
Flandre Intérieure (59-62)	05-juin 3 h	05-juin 9 h	Nul	0,00	100,00	0,00	0,8	306			
	10-juin 7 h	10-juin 14 h	Très léger	0,00			4,4				
Lille Sud (59)	05-juin 4 h	05-juin 5 h	Nul	0,00	100,00	0,00	0,2				
	10-juin 8 h	10-juin 13 h	Nul	0,00			3,8				
Montreuillois (62)	05-juin 3 h	05-juin 8 h	Nul	1,39	100,00	0,00	4,0	180			
	10-juin 7 h	10-juin 12 h	Nul	0,18			5,8				
	10-juin 16 h	en cours	Léger	0,00			0,8				
La Bassée (59)	DNA										
Hainaut (59)	05-juin 4 h	05-juin 8 h	Nul	0,00	100,00	0,00	0,4	11,6			
	10-juin 8 h	10-juin 13 h	Nul	0,00							
Abbevilleois (80-62)	04-juin 3 h	04-juin 8 h	Nul	0,49	100,00	0,00	0,2				
	05-juin 3 h	05-juin 8 h	Nul	0,00			1,4				
	06-juin 6 h	06-juin 9 h	Nul	0,00			0,2				
	07-juin 6 h	07-juin 8 h	Nul	0,00			0,2				
	08-juin 5 h	08-juin 9 h	Nul	0,00			0,2				
	10-juin 8 h	10-juin 12 h	Nul	0,00			4,6				
	11-juin 6 h	en cours	Nul	0,00			0,4				
	Arrageois (62)	05-juin 5 h	05-juin 9 h	Nul			1,11		100,00	0,00	1,0
10-juin 9 h		10-juin 13 h	Nul	0,00							

Tavelure - Modélisation

Zones géographiques	Début de période	Fin de période	Risque associé pour le moment	% d'ascospores projetées		Stock d'ascospores projetables pour le moment	Précipitations associées à cette période pour le moment en mm	Somme des degrés heures depuis le début de la période jusqu'à 11h ce jour			
				associées à cette période pour le moment	depuis début contaminations primaires selon la modélisation de ce jour						
Cambrésis (59)	05-juin 5 h	05-juin 9 h	Nul	0,00	100,00	0,00	0,4				
	10-juin 11 h	10-juin 13 h	Nul	0,00			1,6				
	05-juin 5 h	05-juin 8 h	Nul	0,00			0,4				
	10-juin 9 h	10-juin en cours	Assez Grave	0,00			3,2	283			
Amiénois (80)	05-juin 5 h	05-juin 9 h	Nul	1,15	100,00	0,00	1,0				
	10-juin 9 h	10-juin 13 h	Nul	0,00			2,8				
	04-juin 20 h	05-juin 17 h	Assez Grave	0,66			5,4	2000			
Thiéraise (59-02)	05-juin 21 h	06-juin 8 h	Nul	0,18	100,00	0,00	0,2				
	10-juin 11 h	10-juin 16 h	Nul	0,00			5,6				
	05-juin 9 h	05-juin 12 h	Nul	0,45			1,6				
	06-juin 5 h	06-juin 8 h	Nul	0,00			0,2				
Picardie Verte (80-60)	10-juin 12 h	10-juin 14 h	Nul	0,00	100,00	0,00	1,4				
	Neslois (80-60-02)	-	-				99,03	0,97			
	St Quentinnois (02)	05-juin 6 h	06-juin 10 h	GRAVE			0,00	100,00	0,00	2,0	1900
10-juin 11 h		10-juin 13 h	Nul	0,00	1,5						
Laonnois (02)		05-juin 12 h	05-juin 17 h	Très léger	0,00	100,00	0,00			6,0	1860
		10-juin 13 h	10-juin 15 h	Nul	0,00					3,0	
	Montdidérien (80-60)	05-juin 11 h	05-juin 17 h	Très léger	0,00			100,00	0,00	1,2	2000
10-juin 15 h		10-juin 16 h	Nul	0,00	3,2						
Soissonnais (60-02)		10-juin 12 h	10-juin en cours	Assez Grave	0,00	100,00	0,00			2,8	260
	Senlisien (60)	10-juin 14 h	10-juin 15 h	Nul	0,00			4,4			
Omois (02)	04-juin 21 h	05-juin 8 h	Léger	0,00	100,00	0,00	0,5	2270			
	10-juin 18 h	10-juin 19 h	Nul	0,00			0,5				

DNA : données non accessibles, problème technique / DNE : données non évaluables
* : données obtenues par triangulation



Tavelure sur fruit

Etat des lieux en parcelle :

- **Sortie de tache sur feuille** constatée au cours de la semaine passée dans les secteurs **Montreuillois, Soissonnais** et **Thiérache** ;
- Observation de **contaminations** sur **fruit** dans le **Soissonnais** et **Arrageois** ;
- **Les sorties de taches actuelles** correspondent à des périodes de contamination de fin mai.

	Evolution des contaminations sur pousse par la tavelure			Evolution des contaminations sur fruit par la tavelure		
	4-juin	11-juin	Tendance /S-1	4-juin	11-juin	Tendance /S-1
Flandre Maritime (59)	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	↔
Flandre Intérieure (59-62)		0,0			0,0	
Lille Sud (59)						
Montreuillois (62)	0,0	2,0	↗	0,0	0,0	↔
La Bassée (59)						
Hainaut (59)	0,0	0,0	↔	0,0		
Abbevillois (80-62)						
Arrageois (62)		0,0			1,0	
Cambrésis (59)						
Avesnois (59)						
Amiénois (80)		0,0				
Thiérache (59-02)	3,3	8,0	↗	0,0		
Picardie Verte (80-60)						
Neslois (80-60-02)	30,0			3,0		
St Quentinnois (02)						
Laonnois (02)						
Montdidérien (80-60)						
Beauvaisis (60)						
Soissonnais (60-02)	10,0	10,0	↔	6,0	5,0	↘
Senlisien (60)						
Omois (02)						

Biocontrôle :

- Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage ;
- Retrouvez la liste des produits en cliquant sur le logo suivant :



Carpocapse des prunes



Carpocapse des prunes

Etat des lieux en parcelle


- Captures dans les secteurs **Abbevillois, Montreuillois, Avesnois, Soissonnais et Hainaut** ;
- Captures de **0 à 10 individus** ;
- **86%** des parcelles du réseau concernées.

Analyse des risques

- Aucun dépassement du seuil indicatif de risque.

Gestion des risques

- Les diffuseurs doivent être mis en place dans les jours à venir pour les parcelles en protection par confusion sexuelle ;
- Les pièges à phéromone doivent être installés en parcelles.



Seuil indicatif de risque :

30 captures sur une durée de 7 jours.


Biocontrôle :

- Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage ;
- Retrouvez la liste des produits en cliquant sur le logo suivant :





Mouche de la cerise



Etat des lieux en parcelle

- Captures dans le secteur **de La Bassée et Thiérache** ;
- Captures **de 0 à 10 individus** ;
- **75% des parcelles** du réseau concernées.

Analyses de risques

- La **hausse des températures favorise** la **maturité** des cerises et les **émergences** de la mouche des cerises ;
- Il est impératif donc que les **pièges chromatiques de monitoring soient en place** ;
- La mouche de la cerise adulte mesure environ 3–5 mm et a un **corps noir avec une marque jaune caractéristique sur le dos à la base des ailes** ;
- Ses **ailes** transparentes présentent des **bandes transversales foncées** très typiques.

Gestion des risques

La mise en place de pièges jaunes englués entrecroisés de type Rebell® permet une lutte directe. Le jaune attire ces insectes qui sont capturés dans la glue. Suspendez 2 à 10 pièges croisés à chaque arbre pendant la période de vol. Leur mise en place est impérative à ce stade de la saison. Pensez également à renouveler les pièges selon leur niveau de propreté. Les carabes, les staphylyns, les oiseaux ainsi que certains parasites peuvent permettre de réduire les populations du ravageur.

Ce bulletin est réalisé grâce à l'implication **d'observateurs**.

Vous êtes producteur, conseiller ou technicien en Hauts de France ;
Vous observez régulièrement vos parcelles ;
Vous suivez les vols de lépidoptères ravageurs :

Rejoignez les réseaux de surveillance biologique du territoire.

Faites-vous connaître dès à présent afin de bénéficier d'une aide à la reconnaissance des principaux ravageurs, auxiliaires et maladies et fourniture de matériel.

Vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le dispositif, contactez :

Lauryne POULAIN au 03.21.08.88.77

lauryne.poulain@fredon-hdf.fr

Ou

Martine DEGUETTE au 03.21.08.88.74

martine.deguette@fredon-hdf.fr

Informations pratiques

Ce bulletin est produit sur base d'informations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale ; celle-ci ne peut être transposée telle quelle à chacune des parcelles. Il convient donc avant chaque prise de décision d'intervention, d'aller observer les parcelles ou zones concernées.

Des pratiques alternatives aux traitements notamment autres que ceux de biocontrôle existent, elles sont disponibles sur le site Ecophyto-PIC :

[Portail | Ecophytopic](#)

Vous retrouverez également ponctuellement des liens relatifs à des méthodes alternatives dans ce BSV dans la rubrique « gestion des risques ».

Accès aux autres éditions du BSV

<http://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr/Bulletins-de-sante-du-vegetal-BSV>

<http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/techniques-productions/cultures/bulletins-de-sante-du-vegetal/>

Prochain bulletin le **18 juin**.

Action pilotée par le ministère chargé de de l'Agriculture et de l'Alimentation et de la Transition écologique et solidaire, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité (OFB), par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Ce bulletin est rédigé à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. Il donne la tendance de la situation sanitaire. Toutefois celle-ci ne peut être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Directeur de la publication : Laurent DEGENNE - Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France.

Animateurs filières et rédacteur : [Lauryne POULAIN](#) - FREDON Hauts-de-France ; appui à la mise en œuvre des réseaux et observations : [Martine DEGUETTE](#) - FREDON Hauts-de-France

Bulletin édité sur la base des observations réalisées par les partenaires du réseau Haut-de-France : producteurs, techniciens, FREDON Hauts-de-France

Coordination et renseignements : [Aurélié Albaut](#) - Chambre d'agriculture de la Somme, [Samuel Bueche](#) - Chambre d'Agriculture du Nord - Pas de Calais

Mise en page et diffusion : [Lauryne POULAIN](#) - FREDON Hauts-de-France

Publication gratuite, disponible sur les sites Internet de la [DRAAF Hauts-de-France](#) et des [Chambre d'Agriculture Hauts-de-France](#)