



Bulletin N°1 du 4 mars 2026

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale : celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

A retenir cette semaine

Les conditions météorologiques actuelles favorisent la maturation des périthèces de la tavelure. La maturation des périthèces n'étant toujours pas terminée le risque de contamination reste nul.

Une pression forte en anthonome a lieu en région, laissant craindre l'apparition de dégât sur les futurs bourgeons.

Prévisions météorologiques et risques :

Les conditions météorologiques douces et ensoleillées à venir vont favoriser la maturation des ascospores et le développement des premiers ravageurs.

Sommaire

Risques encourus :

Faible  

Modéré  

Grave  

Phénologie			
<u>Pomme</u>		<u>Poire</u>	
Stade phénologique observé : 		Stade phénologique observé : 	
A à B		B à C	
Risque lié au gel			
Ravageurs			
Charançon :			
<u>Anthonome</u>			
Rapide augmentation du nombre de charançon en région			
Pathologie			
<u>Tavelure</u>			
Maturation des périthèces en cours.			
Auxiliaires			
<u>Développement des auxiliaires :</u>			

Nouvelles légendes concernant les bioagresseurs :

Pour chaque bioagresseur, une icône (voir ci-dessous) précisera les zones de l'arbre susceptibles d'être touchées au cours de la saison, en fonction des différentes parties sensibles.

Légendes : Localisation des dégâts:				
 Sur et à l'intérieur du fruit	 Sur l'épiderme du fruit	 Sur les feuilles / pousses	 Sur les fleurs / bourgeons / boutons	 Dégâts dans les branches / troncs

L'évolution de la pression des populations en verger sera indiquée pour chaque bioagresseur selon la présentation suivante :



Pression nulle à faible



Pression moyenne



Pression forte

Phénologie

Stades phénologiques du pommier et seuils de gel associés



A – seuil non défini




B – seuil à -7°C



C – seuil à -4°C



C3 – seuil à -4°C



D – seuil à -3,5°C



E – seuil à -2,2°C



E2 – seuil à -2,2°C



F – seuil à -2°C




F2 – seuil à -1,8°C



G – seuil non défini

Stades phénologiques du poirier et seuils de gel associés



A – seuil non défini



B – seuil à -7°C




C – seuil à -4°C



C3 – seuil à -4°C



D – seuil à -4,5°C



D3 – seuil à -4,5°C



E – seuil à -2,8°C



E2 – seuil à -2,8°C



F – seuil à -2°C



F2 – seuil à -1,6°C



Risques de dégâts liés au gel

Stade phénologique des pommiers et poiriers selon le secteur et la variété




	St Quentin (02)	Ourcq (60-02)	Compiègne (80-60-02)	Abbeville (80-62)	Avesnois (59-02)	Arras (59-62)	Flandre (59-62)	Lillois (59)	Amiénois (80-60)
POMME									
Baguette d'Hiver									
Belle fleur double									
Boskoop	B			B	A			B	
Cabarette									
Coxybel					A				
Cox's orange	B				A				
Dabinett					A				
Elstar	B								
Gala									
Golden									
Harry Master Jersey					A				
Idared	B				B			B	
Jonagold	B				B			B	
Kermorien					A				
Lanscailler									
Major					B				
Melrose					B				
Malus reinette de waleffe									
Pirouette									



	St Quentin (02)	Ourcq (60-02)	Compiègne (80-60-02)	Abbeville (80-62)	Avesnois (59-02)	Arras (59-62)	Flandre (59-62)	Lillois (59)	Amiénois (80-60)
POIRE									
Angelys									
Concorde									
Conference	B/C			B	C			B/C	
Comice	B/C				C			B/C	
William's	B/C				C3			B/C	

Températures minimales



Conditions : Températures minimales douces. Absence de gelées en région.

Risques encourus : Faibles de part des prévisions climatiques relativement clémentes avec des températures douces

Anthonyme



Anthonyme adulte



Dégâts d'Anthonyme

Etat des lieux

Seuil indicatif de risque : 30 individus pour 100 frappages	Dépassé 
Population	
Captures	De 0 à 49 individus
Secteurs d'observations	Lillois, Abbevillois

Gestion des risques :

- Réaliser des **frappages** sur 50 à 100 arbres à raison de 2 par arbre ;
- Idéalement un **suivi par variété** ;
- Les variétés ayant atteint les **stades B et C** sont déjà sensibles au ravageur.

Méthodes alternatives :

- **Préventif** : favoriser la présence d'oiseaux insectivores comme les mésanges (mise en place de nichoirs), multiplier les frappages (peut diminuer la pression) ;
- **Dépassement du seuil** : attendre la fin de la ponte des adultes et retirer (au stade G/H) l'ensemble des boutons anthonomés ;

Tavelure



Pour poirier

Pathologie



Tavelure

Etat des lieux

Risque	Absence de risque
Seuil de risque (présence de tâche)	Périthèces en cours de maturation (Analyses au laboratoire de la Clinique du Végétal®)
Secteurs d'observations	Arrageois, Flandres, Abbevillois

Analyse des risques :

Les premiers risques de contamination par la tavelure nécessitent :

- Des conditions climatiques favorables ;
- La maturité des périthèces ;
- Le franchissement du stade phénologique de sensibilité (C-C3 sur pommiers et C3-D sur poiriers).

Biocontrôle :

- Anthonyme : Il n'existe pas de produit de biocontrôle autorisé pour cet usage.
- Tavelure : Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage ;
- Il s'agit des substances suivantes : Hydrogénocarbonate de potassium, soufre, phosphonates de potassium, *Bacillus subtilis*

Résistance :

- L'association Tavelure – QoI-P de synthèse, SBIDM ou IDM (classe I), Anilinopyrimidines (AP) est exposé à un risque de résistance

Cliquer sur les logos pour obtenir plus d'informations





Etat des lieux	
Population	
Secteurs d'observations	Ensemble des secteurs
Espèces observées	coccinelles adultes, araignées

Gestion :

- Les auxiliaires sont des atouts importants au sein d'un verger, ils permettent une lutte biologique et naturelle contre les différents ravageurs ([Lien vers fiche technique: Les Syrphes prédateurs de pucerons](#)).
- Les favoriser, c'est aider votre verger à être plus résilient face aux différents ravageurs.



Araignée prédatant une chenille

Réseaux BSV arboriculture fruitière

Informations pratiques

Ce bulletin est produit sur base d'informations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale ; celle-ci ne peut être transposée telle quelle à chacune des parcelles. Il convient donc avant chaque prise de décision d'intervention, d'aller observer les parcelles ou zones concernées.

Des pratiques alternatives aux traitements notamment autres que ceux de biocontrôle existent, elles sont disponibles sur le site Ecophyto-PIC : [Portail](#) | [Ecophytopic](#)

Ce bulletin est réalisé grâce à l'implication **d'observateurs**. Plus les observateurs sont nombreux et bien répartis sur le territoire, plus le Bulletin donne une image précise et fiable de la santé des végétaux en Hauts-de-France. Vous êtes producteur, conseiller ou technicien en Hauts de France ; **Rejoignez les réseaux de surveillance biologique du territoire** tout en renforçant vos connaissances en santé et protection des végétaux. Vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le dispositif, contactez :

Axel BEAUCHAMP au 03.21.08.88.77
axel.beauchamp@fredon-hdf.fr

ou

Martine DEGUETTE au 03.21.08.88.74
martine.deguette@fredon-hdf.fr

Accès aux autres éditions du BSV

<http://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr/Bulletins-de-sante-du-vegetal-BSV>

<http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/techniques-productions/cultures/bulletins-de-sante-du-vegetal/>

Prochain bulletin la semaine prochaine.

Action pilotée par le ministère chargé de de l'Agriculture et de l'Alimentation et de la Transition écologique et solidaire, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité (OFB), par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Ce bulletin est rédigé à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. Il donne la tendance de la situation sanitaire. Toutefois celle-ci ne peut être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Directeur de la publication : Laurent DEGENNE - Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France.

Animateurs filières et rédacteur : [Axel BEAUCHAMP](#) (Tél 03.21..08.88.77)- FREDON Hauts-de-France ; appui à la mise en œuvre des réseaux et observations :

[Martine DEGUETTE](#) - FREDON Hauts-de-France

Bulletin édité sur la base des observations réalisées par les partenaires du réseau Haut-de-France : producteurs, techniciens, FREDON Hauts-de-France

Coordination et renseignements : [Aurélien Albaut](#) - Chambre d'agriculture de la Somme, [Samuel Bueche](#) - Chambre d'Agriculture du Nord - Pas de Calais

Mise en page et diffusion : [Axel Beauchamp](#) - FREDON Hauts-de-France

Publication gratuite, disponible sur les sites Internet de la [DRAAF Hauts-de-France](#) et des [Chambre d'Agriculture Hauts-de-France](#)