



Bulletin N°3 du 11 mars 2026

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale : celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

A retenir cette semaine

Les conditions météorologiques actuelles favorisent la maturation des ascospores de la tavelure. La maturation des périthèces est terminée et les premières contaminations commencent déjà.

La pression en anthonome se maintient en région, laissant craindre l'apparition de dégât sur les futurs bourgeons.

Prévisions météorologiques et risques :

Les conditions météorologiques douces à fraîches à venir montrent l'absence de risque lié au gel mais les conditions pluvieuses vont favoriser les risques de contaminations à la tavelure.

Sommaire

Risques encourus :

Faible  

Modéré  

Grave  

Phénologie			
Pomme		Poire	
Stade phénologique observé : 		Stade phénologique observé : 	
A à C3		B à D	
Risque lié au gel			
Ravageurs			
Charançon :			
Anthonome			
Nombreux en région			
Pathologie			
Tavelure			
Maturation des périthèces terminée, Contaminations en cours			
Auxiliaires			
Développement des auxiliaires :			



Risques de dégâts liés au gel

Stade phénologique des pommiers et poiriers selon le secteur et la variété



St Quentinois (02) Ourcqois (60-02) Compiégnois (80-60-02) Abbevillois (80-62) Avesnois (59-02) Arrageois (59-62) Flandres (59-62) Lillois (59) Amiénois (80-60)

POMME

	St Quentinois (02)	Ourcqois (60-02)	Compiégnois (80-60-02)	Abbevillois (80-62)	Avesnois (59-02)	Arrageois (59-62)	Flandres (59-62)	Lillois (59)	Amiénois (80-60)
Baguette d'Hiver									
Belle fleur double									
Boskoop	B			C	C3	D	C/C3	B	
Cabarette									
Coxybel					A				
Cox's orange	B				C3		B		
Dabinett					A				
Elstar	B				C3		C		
Gala						C3			
Golden									
Harry Master Jersey					B				
Idared	B				C3	C3	C	C	
Jonagold	B			C	C3	C3	C	C3	
Kermerrien					B				
Lanscailler									
Major					B				
Melrose					B				
Malus reinette de waleffe									
Pirouette									




St Quentinois (02) Ourcqois (60-02) Compiégnois (80-60-02) Abbevillois (80-62) Avesnois (59-02) Arrageois (59-62) Flandres (59-62) Lillois (59) Amiénois (80-60)

POIRE

	St Quentinois (02)	Ourcqois (60-02)	Compiégnois (80-60-02)	Abbevillois (80-62)	Avesnois (59-02)	Arrageois (59-62)	Flandres (59-62)	Lillois (59)	Amiénois (80-60)
Angelys					D				
Concorde									
Conference	B/C			B	D	D	C3	D	
Comice	B/C				D	C3			
William's	B/C				C3				

Températures minimales



Conditions : Températures minimales douces. Absence de gelées en région.

Risques encourus : Faibles de part des prévisions climatiques montrant des températures douces à fraîches sans passer sous les 0°C.

Anthonyme



Anthonyme adulte



Dégâts d’Anthonyme

Etat des lieux	
Seuil indicatif de risque : 30 individus pour 100 frappages	Dépassé 
Population	=
Captures	De 0 à 34 individus
Secteurs d’observations	Lillois, Abbevillois

Gestion des risques :

- Réaliser des **frappages** sur 50 à 100 arbres à raison de 2 par arbre ;
- Idéalement un **suivi par variété** ;
- Les variétés ayant atteint les **stades B et C** sont déjà sensibles au ravageur.

Méthodes alternatives :

- **Préventif** : favoriser la présence d’oiseaux insectivores comme les mésanges (mise en place de nichoirs), multiplier les frappages (peut diminuer la pression) ;
- **Dépassement du seuil** : attendre la fin de la ponte des adultes et retirer (au stade G/H) l’ensemble des boutons anthonomés ;

Biocontrôle :

- Anthonyme : Il n’existe pas de produit de biocontrôle autorisé pour cet usage.

Crédit photographique FREDON Hauts-de-France

Analyse de risque et Sectorisation

L'analyse de risque sur le gel, la tavelure et le carpocapse reposera sur les secteurs suivants : Flandres, Lillois, Abbevillois, Arrageois, Avesnois, Compiégnois, St Quentinnois et l'Ourcquois. La répartition des différents secteurs se décompose comme suit :



Cartographie des secteurs arboricoles FREDON Hauts-de-France



Tavelure

Etat des lieux	
Risque	Absence de Très léger à Assez Grave
Seuil de risque (présence de tâche)	En cours de maturation
Secteurs d'observations	Ensemble des secteurs

Analyse des risques :

Selon la modélisation, les **stocks projetables** sont à ce jour de **0,42% en moyenne**, variant selon les secteurs de 0,38% à 0,46%.

Au cours des dernières périodes de contaminations, les **taux de projections** s'échelonnent de 0,05% à 0,12% pour **une moyenne de 0,09%**.

Credit photographique FREDON Hauts-de-France

Zones géographiques	Début de période	Fin de période (données jusqu'à 16h)	Risque associé pour le moment	% d'ascospores projetées	% d'ascospores projetables pour les futures périodes	Précipitations associées à cette période pour le moment en mm	Prévision de sorties de tâches	Prévision prochaines contaminations
Flandre (59)	10-mars 9h	en cours	Très léger	0,05	0,38	0,2	En cours d'incubation	11/03 ; 13/03
Lillois (59-62)	10-mars 8h	en cours	Très léger	0,05	0,43	0,7		11/03 ; 13/03 ; 14/01
Abbevilleois (80-62)	10-mars 16h	en cours	Très léger	0,06	0,45	0,2		11/03 ; 13/03 ; 14/02
Arrageois (59-62)	10-mars 3h	en cours	Léger	0,11	0,42	2,8		11/03 ; 13/03 ; 14/03
Avesnois (59-02)	10-mars 5h	10-mars 16h	Très léger	0,10	0,39	2,2		11/03 ; 13/03 ; 14/01
Amiénois (60-80)	10-mars 1h	10-mars 16h	Léger	0,11	0,44	5,4		11/03 ; 13/03 ; 14/02
Compiégnois (02-60-80)	10-mars 2h	en cours	Assez Grave	0,10	0,38	1,0		11/03 ; 13/03 ; 14/03
St Quentinnois (02)	10-mars 10h	en cours	Très léger	0,11	0,41	0,8		11/03 ; 13/03 ; 14/03
Ourcqnois (02-60)	10-mars 10h	en cours	Très léger	0,12	0,46	0,4		11/03 ; 13/03 ; 14/02

Biocontrôle :

- Tavelure : Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage ;
- Il s'agit des substances suivantes : Hydrogénocarbonate de potassium, soufre, phosphonates de potassium, *Bacillus subtilis*

Résistance :

- L'association Tavelure – QoI-P de synthèse, SBIDM ou IDM (classe I), Anilinyrimidines (AP) est exposé à un risque de résistance

Cliquer sur les logos pour obtenir plus d'informations





Etat des lieux	
Population	
Secteurs d'observations	Ensemble des secteurs
Espèces observées	coccinelles adultes, araignées



Araignée prédatant une chenille

Gestion :

- Les auxiliaires sont des atouts importants au sein d'un verger, ils permettent une lutte biologique et naturelle contre les différents ravageurs ([Lien vers fiche technique: Les Syrphes prédateurs de pucerons](#)).
- Les favoriser, c'est aider votre verger à être plus résilient face aux différents ravageurs.

Réseaux BSV arboriculture fruitière

Informations pratiques

Ce bulletin est produit sur base d'informations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale ; celle-ci ne peut être transposée telle quelle à chacune des parcelles. Il convient donc avant chaque prise de décision d'intervention, d'aller observer les parcelles ou zones concernées.

Des pratiques alternatives aux traitements notamment autres que ceux de biocontrôle existent, elles sont disponibles sur le site Ecophyto-PIC : [Portail](#) | [Ecophytopic](#)

Ce bulletin est réalisé grâce à l'implication **d'observateurs**. Plus les observateurs sont nombreux et bien répartis sur le territoire, plus le Bulletin donne une image précise et fiable de la santé des végétaux en Hauts-de-France. Vous êtes producteur, conseiller ou technicien en Hauts de France ; **Rejoignez les réseaux de surveillance biologique du territoire** tout en renforçant vos connaissances en santé et protection des végétaux. Vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le dispositif, contactez :

Axel BEAUCHAMP au 03.21.08.88.77
axel.beauchamp@fredon-hdf.fr

ou

Martine DEGUETTE au 03.21.08.88.74
martine.deguette@fredon-hdf.fr

Accès aux autres éditions du BSV

<http://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr/Bulletins-de-sante-du-vegetal-BSV>

<http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/techniques-productions/cultures/bulletins-de-sante-du-vegetal/>

Prochain bulletin la semaine prochaine.

Action pilotée par le ministère chargé de de l'Agriculture et de l'Alimentation et de la Transition écologique et solidaire, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité (OFB), par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Ce bulletin est rédigé à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. Il donne la tendance de la situation sanitaire. Toutefois celle-ci ne peut être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Directeur de la publication : Laurent DEGENNE - Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France.

Animateurs filières et rédacteur : [Axel BEAUCHAMP](#) (Tél 03.21..08.88.77)- FREDON Hauts-de-France ; appui à la mise en œuvre des réseaux et observations :

[Martine DEGUETTE](#) - FREDON Hauts-de-France

Bulletin édité sur la base des observations réalisées par les partenaires du réseau Haut-de-France : producteurs, techniciens, FREDON Hauts-de-France

Coordination et renseignements : [Aurélien Albaut](#) - Chambre d'agriculture de la Somme, [Samuel Bueche](#) - Chambre d'Agriculture du Nord - Pas de Calais

Mise en page et diffusion : [Axel Beauchamp](#) - FREDON Hauts-de-France

Publication gratuite, disponible sur les sites Internet de la [DRAAF Hauts-de-France](#) et des [Chambre d'Agriculture Hauts-de-France](#)