



Bulletin n°11 du 16 juillet 2026

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale : celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

SOMMAIRE

- ▶ **POIREAU** : les conditions sèches sont très favorables aux thrips.
- ▶ **OIGNON** : présence de thrips, fusariose et stemphyliose.
- ▶ **CELERI** : aucune capture de mouche de la carotte ni de mouche du céleri.
- ▶ **SALADES** : attention aux chenilles.
- ▶ **CHOUX** : attention aux aleurodes, aux chenilles, aux altises...
- ▶ **ENDIVE** : conditions propices au développement des pucerons lanigères.
- ▶ **POIS** : symptômes d'oïdium sur la côte.
- ▶ **CAROTTE** : alternaria dans l'Aisne.
- ▶ **HARICOT** : premières captures de noctuelles Héliothis, dégâts de mouches des semis.

POIREAU


Réseau : 3 parcelles

Stade : 4 feuilles à récolte.



Thrips

Les conditions actuelles chaudes et sèches sont très favorables aux thrips. A Wormhout (59), des thrips sont observés sur 80% des poireaux. A Ennetières-en-Weppes (59), entre 1 et 2 thrips sont présents sur 16% des poireaux observés. Quelques dégâts sont aussi signalés sur cette parcelle ainsi qu'à Violaines (62). Des auxiliaires (aeolothrips, œufs de chrysope) sont observés dans les parcelles et sur les plaques bleues. Sur les pièges bleus mis en place à Wormhout (59) et à Violaines (62), la pression diminue légèrement par rapport à la semaine dernière. Les températures et les conditions sèches annoncées pour les prochains jours vont être favorables au développement des thrips. Restez vigilants.



Il existe une solution de biocontrôle, il s'agit de la substance active suivante : huile essentielle d'orange douce.

Retrouvez la liste actualisée des produits de biocontrôle sur le site : [https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrle#accordeon-59985](https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrrole#accordeon-59985)




Mouche mineuse (*Phytomyza gymnostoma*)

A Violaines (62), des piqûres de mouche mineuse sont toujours présentes sur 28% des pieds observés bien que les conditions sèches actuelles ne lui soient pas très favorables.



Mineuses

A Violaines (62), quelques dégâts de mineuse sont signalés sur 48% des pieds. Dans la bibliographie, d'autres espèces de mineuses que *Phytomyza gymnostoma* peuvent se développer sur poireaux (par exemple *Chromatomyia horticola* ou *Liriomyza nitzkei*) mais généralement elles ne sont pas nuisibles sur poireau.



Pucerons

A Ennetières-en-Weppes (59), quelques pucerons sont observés sur 4% des pieds. Des auxiliaires sont aussi présents (œufs de

chrysope). Normalement, aucune population de pucerons n'infeste les cultures de poireaux mais les formes ailées peuvent être vectrices de virus et il y a déjà eu plusieurs cas de colonisation avec l'espèce *Neotoxoptera formosana* les années précédentes.

Montaison

A Violaines (62), quelques problèmes de montaison sont toujours observés. Les principaux facteurs favorables à la montaison sont essentiellement climatiques.

OIGNON

Réseau : 1 parcelle et parcelles flottantes

Stade : bulbaison début tombaison.



Thrips

Des thrips sont toujours observés dans de nombreuses parcelles (Plaine de la Lys, dans les Flandres). La pression reste faible. A Richebourg (62), 1 à 6 thrips sont présents sur



Thrips sur oignon (PLRN)

68% des oignons, les dégâts sont observés sur 20% des pieds. Des auxiliaires sont également présents (aélothrips, œufs de chrysope...) Les conditions météorologiques prévues dans les prochains jours vont être favorables à leur développement mais dans notre région, sur oignon, il y a souvent peu de problèmes liés aux thrips.



Il existe une solution de biocontrôle, il s'agit de la substance active suivante : huile essentielle d'orange douce.

Retrouvez la liste actualisée des produits de biocontrôle sur le site :
<https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle#accordeon-59985>



Fusariose (*Fusarium oxysporum*)

De la fusariose est signalée sur une parcelle à Noordpeene (59) et à Steenvoorde (59), quelques ronds sont observés dans ces parcelles. La fusariose se déclare quand le sol atteint des températures comprises entre 15 et 30°C. Les dégâts sont plus importants quand il y a un tassement du sol (cuvette par exemple). La rotation est l'une des principales mesures de lutte prophylactique connue sur oignon de semis, évitez le retour de cultures d'oignons sur une parcelle qui s'est révélée contaminée les années précédentes.



Fusariose (PLRN)



Il existe une solution de biocontrôle, il s'agit de la substance active suivante : *Trichoderma asperrelum*.

Retrouvez la liste actualisée des produits de biocontrôle sur le site : <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle#accordeon-59985>



Stemphylium (*Stemphylium vesicarium*)

Un peu de stemphylium est présent sur des parcelles à Noordpeene (59), Caestre (59), Steenvoorde (59), sur environ 5% des oignons. Les premiers symptômes sont similaires à ceux de l'alternaria. L'attaque démarre par des petits points aqueux variant du jaune clair au brun. Puis les taches s'allongent et deviennent brun clair au centre, brun plus foncé sur les côtés. Les taches se rejoignent pour assombrir l'ensemble de la feuille et des fructifications noires deviennent visibles. Les conditions chaudes et humides lui sont favorables tout comme les piqûres d'insectes et les champignons. C'est un champignon secondaire qui ne pose généralement pas de problème dans la région.

CELERI



Mouche du céleri (*Euleia heraclei*) et mouche de la carotte (*Psila rosae*)

Aucune mouche du céleri ni mouche de la carotte n'a été capturée à Clairmarais (62) et à Hinges (62) sur plaques jaunes.

SALADES

Réseau : 3 parcelles et un piégeage.


Stade : plantation à récolte



Pucerons

La pression reste assez faible. Des auxiliaires (adultes de coccinelles, œufs de chrysope...) sont

Pourcentage de salades avec la présence de pucerons aptères



aussi observés. Les températures prévues dans les prochains jours vont leur être assez favorables.



Noctuelle gamma

(*Autographa gamma*)

De manière générale, les captures sont assez importantes et la pression reste élevée. A Haubourdin (59), une ponte et

Commune	Nombre de noctuelle gamma par piège
Ennetières-en-Weppes (59)	-
Haubourdin (59)	22 
Le Maisnil (59)	190 
Avelin (59)	Plus de 60 

une chrysalide sont présents sur 4% des pieds. Des dégâts sont également présents sur 12% des salades. A Le Maisnil (59), 8% des salades sont touchées par les dégâts de chenille. Des œufs et des chenilles sont signalés sur 20% des pieds à Avelin (59). A Verlinghem (59), la pression est forte puisque 30% des pieds présentent des chenilles et / ou des dégâts. Soyez vigilants, les températures annoncées pour les prochains jours vont être plutôt favorables. Observez régulièrement vos parcelles pour détecter les pontes et les jeunes chenilles.



Il existe des produits de biocontrôle autorisés sur chenilles. Il s'agit des substances actives suivantes : *Steinernema feltiae* (sous abri uniquement), *Bacillus thuringiensis* subsp. aizawai et de *Bacillus thuringiensis* subsp. Kurstaki (à utiliser en alternance et sur très jeunes larves pour de meilleurs résultats). Retrouvez la liste actualisée des produits de biocontrôle sur le site :

<https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrrole#accordeon-59985>

Cicadelle

A Haubourdin (59), quelques cicadelles et piqûres sont présentes sur 20% des salades. Pour le moment, il n'y a pas de conséquences majeures sur les salades à cause de ce ravageur.



Aleurode



A Haubourdin (59), quelques adultes d'aleurodes sont présents. Pour le moment, il n'y a pas de conséquences majeures sur les salades à cause de ce ravageur.

ENDIVE

Réseau : 1 parcelle et 8 piégeages.

Stade : 8 feuilles

Mouche de l'endive (*Napomyza cichorii*)

Les captures ont été réalisées sur 7 des 9 sites suivis et elles ne dépassent pas le seuil de nuisibilité cette semaine (3 bacs jaunes par parcelle, 15 captures cumulées en 14 jours.), elles sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.

Site de piégeage	Mouche de l'endive						
	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29
Ailly-le-haut-Clocher (80)	-	-	-	-	0	1	-
Loos en Gohelle (62)	0	1	1	4	1	0	4
Aubers (59)	1	0	3	1	0	0	5
Noreuil (62)	1	0	0	0	0	0	0
Arras (62)	-	7	9	0	0	2	2
Boursies (59)	-	-	-	10	5	3	7
Marcelcave (80)	-	-	-	-	0	0	1
Metz-en-Couture (62)	-	-	5	0	0	0	1
Pouilly-sur-Serre (02)	-	-	-	-	1	0	-
Soyécourt (80)	0	3	0	0	0	0	2
Villeneuve d'Ascq (59)			5	2	0	9	0

Aleurodes



A Loos-en-Gohelle (62), un à cinq aleurodes sont observés sur

20% des pieds. Les conditions actuelles lui sont favorables mais ces insectes ne sont pas connus comme étant ravageurs de l'endive. A surveiller tout de même.

Pucerons

lanigères



Le vol
de

pucerons lanigères

est terminé.

Quelques mouches

de *Thaumatomyia*

spp., (auxiliaire dont

la larve est

Commune	Pemphigus	Thaumatomyia
Loos en Gohelle (62)	0 =	3 
Aubers (59)	0 =	3 
Noreuil (62)	0 =	40 
Arras (62)	0 =	19 
Metz-en-Couture (62)	0 =	6 
Soyécourt (80)	0 =	4 
Boursies (59)	0 =	1 
Villeneuve d'Ascq (59)	0 =	0 
Marcelcave (80)	0 	1 
Ailly-le-haut-Clocher (80)		
Pouilly-sur-serre (02)		

prédatrice des pucerons lanigères) ont été capturées. Les données ne permettent pas de savoir si elles pourront contrôler les populations de *Pemphigus*. Les conditions chaudes et sèches actuelles sont très favorables à la multiplication des pucerons sur les racines.

Auxiliaires

Quelques œufs de chrysope sont observés sur la parcelle à Loos-en-Gohelle (62).

CHOUX

Réseau : 5 parcelles

Stade : plantation à pommaison



Gibier

A Auchy-les-Mines (62), quelques dégâts sont observés sur une jeune plantation. Des mesures prophylactiques existent :

- méthodes utilisant les sons et/ou le bruit (gibier à plume).

- méthodes utilisant l'effarouchement visuel (gibier à plume et poils).
- L'installation d'un filet/bâche constitue la seule méthode qui peut donner près de 100% de résultat. La mise en place de clôture électrique est aussi très efficace contre les ravageurs à poils.

Le gibier s'habitue plus ou moins rapidement à ces techniques. Il est important de mettre le système de dissuasion dans la parcelle avant que les dégâts ne commencent. Pour améliorer leur efficacité, on peut cumuler plusieurs techniques et en modifier les applications (déplacement des épouvantails, réglage aléatoire des détonateurs...) pour éviter l'accoutumance. Elles doivent être adaptées aux espèces présentes et à l'environnement de la parcelle (habitations, ...).



Larve de syrphe et chenille de teigne (FREDON HdF)

Pucerons cendrés



(*Brevicoryne brassicae*) et pucerons verts

A Ennetières-en-Weppes (59), 1 à 7 pucerons sont présents sur 12% des pieds. A Auchy-les-Mines (62), quelques pucerons ailés sont signalés sur choux-fleurs. Des auxiliaires sont aussi présents (pontes de coccinelles, œufs et larves de

syrphe, œufs de chrysope, parasitoïdes, ...). Les conditions météorologiques des prochains jours devraient leur être assez favorables.

Mouche du chou (*Delia radicum*)



Dans les feutrines, à Ennetières-en-Weppes (59), quelques œufs ont été observés sur 20% des feutrines. La pression est faible et les conditions climatiques chaudes actuelles ne lui sont pas favorables.



Explosion des populations d'aleurodes du chou dans les parcelles (Marché de Phalempin)

Aleurodes (*Aleyrodes protella*)



Les populations d'aleurodes explosent à Auchy-les-Mines (62), environ 45 adultes, 40 larves et 25 pontes sont présents sur jeunes choux fleurs. A Ennetières-en Weppes (59), des adultes, des pontes et quelques larves sont observés sur 96% des choux cabus. A Illies (59), plus de 100 aleurodes sont présents sur certaines feuilles.

Les conditions actuelles lui sont favorables. Restez vigilants en observant régulièrement la face

inférieure des feuilles des choux. L'aleurode du chou prélève la sève des choux et sécrète du miellat ce qui favorise le développement de fumagine pouvant entraîner une perturbation du développement du chou et une perte de rendement. Les conditions sèches et chaudes (température supérieure à 20°C) lui sont favorables.

Des mesures préventives et des solutions alternatives peuvent être mises en place pour éviter l'infestation d'aleurodes : limiter le nombre de Brassicacées dans la rotation et en interculture ; éviter de cultiver des choux à proximité d'autres cultures de Brassicacées ; détruire les résidus de cultures et les adventices de la famille des Brassicacées ; irriguer les parcelles lorsque c'est possible, entretenir les bordures de parcelles ; favoriser les auxiliaires des cultures.



Piérides, noctuelles et teigne des crucifères

A Illies (59), un
vol de piérides est
en cours. A
Ennetières-en-

Site de piégeage	Noctuelle gamma	Teigne des crucifères
Ennetières-en-Weppes (59)	-	2
Illies (59)	16	7
Saint Omer (62)	51	0 =
Campagne les Hesdin (62)	-	-
Campagne les Hesdin (62)	-	-
Lorgies (62)	29	0 =

Weppes (59), de nombreux dégâts de chenilles sont observés, un vol de piérides est aussi en cours. Des œufs de piéride de la rave sont observés sur 8% des choux cabus ainsi que des chenilles et cocons de teigne qui sont signalés sur respectivement 12 et 32% des pieds. Des chenilles de noctuelle sont présents sur 4% des pieds. Les températures des prochains jours vont être favorables aux papillons. Surveillez vos parcelles pour détecter les premières pontes et chenilles.



Il existe des solutions de biocontrôle efficaces si elles sont appliquées sur jeunes chenilles. Il s'agit de substances actives *Bacillus thuringiensis* subsp. aizawai et de *Bacillus thuringiensis* subsp. Kurstaki (à utiliser en alternance et sur très jeunes larves pour de meilleurs résultats). Retrouvez la liste actualisée des produits de biocontrôle sur le site :

<https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle#accordeon-59985>

Altises (*Phyllotreta* sp.)



A Illies (59), de nombreuses altises et des dégâts sont présents sur les jeunes choux. A Ennetières-en-Weppes (59), 1 à 15 altises sont présentes sur 36% des choux cabus. Restez vigilants, les conditions climatiques sont très favorables. Observez régulièrement vos cultures de Brassicacées, même lorsqu'elles sont recouvertes d'un

voile. Les choux sont sensibles à ce ravageur entre la plantation et le stade 8 feuilles.

POIS

Réseau : compilation des tours de plaine

Stade : récolte



Tordeuses du pois

Aucune capture signalée cette semaine.



Oïdium

Quelques symptômes d'oïdium sont encore observés sur les variétés sensibles, notamment sur les pois situés sur la côte.



Oïdium sur pois – photo UNILET archive

CAROTTE

Réseau : 6 parcelles fixes + compilation des tours de plaine

Stade : stade récolte



Alternaria

L'irrigation des parcelles de carottes favorise la présence d'Alternaria sur plusieurs parcelles de l'Aisne.



Alternaria sur carotte – photo UNILET archive



Mouche de la carotte et du céleri

Aucune mouche n'est capturée à Lorgies (62), à Haubourdin (59), à Saint-Omer (62), à Marchais (02), à Gentelles (80), ni à Hinges (62).

HARICOTS

Réseau : compilation des tours de plaine

Stade : levée – floraison

La chaleur de ces jours-ci provoque des avortements de fleurs et de gousses dans ce secteur.

Gibier

Des dégâts d'oiseaux sont signalés sur plusieurs parcelles picardes.



Mouche des semis

De faibles dégâts de mouche des semis sont observés sur des parcelles dans l'Aisne.



Noctuelles Héliothis et pyrales

Des premières captures d'Héliothis sont signalées en Seine-et-Marne et dans l'Aisne.

Le piégeage fournit une information sur les vols des papillons, mais il n'y a pas de corrélation entre le niveau de capture et les dégâts potentiels.

L'observation des parcelles est indispensable pour évaluer le risque et doit être renforcée à partir de la floraison : recherche de pontes/œufs sur la face inférieure des feuilles, de chenilles, de trous dans les tiges et les gousses.

L'attractivité est maximale au moment de la floraison et du grossissement des gousses pour les pyrales et les noctuelles (Héliothis). Les haricots

beurre et flageolet sont particulièrement attractifs. Les précédents maïs à proximité des parcelles de haricots constituent un facteur de risque supplémentaire face à la pyrale.

Les abeilles, des alliées pour nos cultures : protégeons-les !

A l'échelle mondiale, 80 % des plantes à fleurs se reproduisent grâce à ces insectes auxiliaires et en particulier grâce aux abeilles. La préservation de la santé du cheptel apicole implique la mise en place de bonnes pratiques au niveau de la gestion des ressources alimentaires des abeilles, de la maîtrise des risques sanitaires et de l'utilisation raisonnée des produits phyto-pharmaceutiques en protection des cultures.

Les pouvoirs publics ont renforcé les études écotoxicologiques, la réglementation, ainsi que les contrôles sanitaires et phytosanitaires visant à protéger les insectes pollinisateurs.

Plus d'informations sur la protection des abeilles en cliquant sur ces différents liens :

[Information sur la réglementation pour la protection des insectes pollinisateurs.](#)
[Arrêté Abeilles et liste des cultures non attractives](#)

Action pilotée par le ministère chargé de l'Agriculture et le ministère de l'Ecologie, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto, et celui du Conseil Régional Hauts-de-France.

Ce bulletin est rédigé à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. Il donne la tendance de la situation sanitaire. Toutefois celle-ci ne peut être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Directeur de la publication : Laurent DEGENNE - Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France.

Avec la participation d'AGRIFREEZ/TRINATURE, ARDO/AGORIS, BONDUELLE, CETA ENDIVES ARTOIS, ELCHAIS, Endilaon, EXPANDIS, Marché de Phalempin, Natur'coop, GREENYARD/OP Vallée de la Lys, OPLINORD, OPLVERT, Primacoop, SIPEMA, SODELEG, TY Consulting, et des producteurs observateurs.

Bulletin rédigé par les animateurs régionaux de la filière cultures légumières - Tous légumes : L. DURLIN - FREDON Hauts-de-France ; Oignon : S. DOYER - PLRN ; Chou-fleur, choux et Poireau : A. ESPINASSE - PLRN ; Salades : O. BAUDE - PLRN ; Carotte, Epinard, Pois de conserve et Haricots verts : P. MATHIEU - UNILET ; Endive : M. BENIGNI - APEF ; Céleri : R. CATTEAU - PLRN

Coordination et renseignements : Aurélie ALBAUT - Chambre d'agriculture de la Somme / Samuel BUECHE - Chambre d'Agriculture du Nord - Pas de Calais

Publication gratuite, disponible sur les sites Internet de la [DRAAF](#) et [Chambre d'Agriculture des Hauts-de-France](#)

