Bulletin de santé du végétal
CULTURES LEGUMIERES
Hauts-de-France

Bulletin n°29 du 26 novembre 2026

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale : celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

SOMMAIRE

► **POIREAU : les parcelles sont assez saines au niveau sanitaire.**
► **CHOUX : présence d'aleurodes et de symptômes de maladies.**

POIREAU

Réseau : 4 parcelles

Stade : 10 feuilles à récolte.



Les parcelles sont assez saines au niveau sanitaire. (FREDON HdF)

Les parcelles sont assez saines au niveau sanitaire.



Rouille

A Loos-en-Gohelle (62), quelques pustules de rouille sont observées sur 12% des pieds. La pression est faible et les conditions sont peu propices au développement de la maladie en ce moment : les températures inférieures à 5°C vont bloquer la maladie. La tolérance à la rouille est très variable d'une variété de poireau à l'autre, et le choix d'une variété tolérante est le meilleur levier de lutte contre la maladie.

Stemphyliose/Alternariose / maladie des taches pourpres



A Loos-en-Gohelle (62) et Ennetières-en-Weppes (59), quelques taches faisant penser à des symptômes de Stemphyliose / alternaria sont présentes sur environ 5% des pieds. Les deux maladies sont indifférenciables sur le terrain. Le nombre de poireaux touchés peut être important sans que les dégâts ne soient graves (feuilles retirées au parage).



Mildiou (*Phytophthora porri*)

A Loos-en-Gohelle (62), une seule tache de mildiou a été observée. La pression est faible et les conditions climatiques sont assez peu propices au développement de la maladie.

Cette maladie est essentiellement hivernale, mais elle peut apparaitre plus précocement à la faveur d'une forte hygrométrie et d'une relative douceur... La durée d'incubation sera variable et fonction de la température. Choisir des parcelles bien drainantes pour éviter toute stagnation prolongée d'eau.



Durée de développement du mildiou en fonction des températures

Mouche mineuse du poireau (*Phytomyza gymnostoma*)

Dans le Ternois (62), dans un jardin amateur, de nombreuses pupes sont observées dans les poireaux. Il y a deux semaines des piqûres fraîches étaient encore présentes. Des mesures préventives peuvent être appliquées : gérer les tas de déchets d'Alliacées (bâchage, …) ; détruire et enfouir profondément les résidus de cultures d'Alliacées ; allonger la rotation ; favoriser les auxiliaires (notamment les hyménoptères parasitoïdes qui semblent jouer un rôle de régulation naturelle vis-à-vis de *Phytomyza gymnostoma*).



Piqûres et pupes de mouches mineuse. (FREDON HdF)



Thrips

Aucun thrips vivant n'a été observé cette semaine à Loos-en-Gohelle (62), Violaines (62) et Ennetières-en-Weppes (59) mais les dégâts restent assez importants sur ces 3 parcelles. Avec les températures comprises entre -2 et 9°C prévues les prochains jours, le risque est quasi nul.

Montaison

A Ennetières-en-Weppes (59), quelques problèmes de montaison sont observés. Les principaux facteurs favorables à la montaison sont essentiellement climatiques mais quelques mesures préventives peuvent être mises en place pour limiter le problème :

• Choix de variétés dites résistantes à la montaison.

• Pour la production de plants en serre, tentez de maintenir une température supérieure à 12°C

• Respectez les dates de plantations conseillées

• Ne stockez pas trop longtemps les plants en pépinières, évitez de les exposer trop longtemps au froid…

CHOUX

Stade : pommaison à récolte

Aleurodes (*Aleyrodes protella*)



A Loos-en-Gohelle (62), sur choux frisés, de nombreux aleurodes sont observés même avec la présence d'un filet anti-insecte. Le froid ne permet pas de réduire suffisamment les populations. La pression reste assez forte mais les conditions climatiques annoncées pour les prochains jours ne vont pas être très favorables à leur développement.

L'aleurode du chou prélève la sève des choux et sécrète du miellat ce qui favorise le développement de fumagine pouvant entraîner une

perturbation du développement du chou, une perte de rendement et un refus à la commercialisation. Les conditions sèches et chaudes (température supérieure à 20°C) lui sont favorables.
Des mesures préventives et des solutions alternatives peuvent être mises en place pour éviter l'infestation d'aleurodes : limiter le nombre de Brassicacées dans la rotation et en interculture ; éviter de cultiver des choux à proximité d'autres cultures de Brassicacées ; détruire les résidus de cultures et les adventices de la famille des Brassicacées ; irriguer les parcelles lorsque c'est possible, entretenir les bordures de parcelles ; favoriser les auxiliaires des cultures.



Maladies des taches noires (*Mycosphaerella brassicola*, *Alternaria brassicae* et *Alternaria brassicicola*)

Sur choux blancs, à Fléchin (62), quelques taches ont été observées sur les feuilles de la couronne, sur environ 30% des choux.

Action pilotée par le ministère chargé de l'Agriculture et le ministère de l'Ecologie, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto, et celui du Conseil Régional Hauts-de-France.
Ce bulletin est rédigé à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. Il donne la tendance de la situation sanitaire. Toutefois celle-ci ne peut être transposée telle quelle à chacune des parcelles.
Directeur de la publication : Laurent DEGENNE - Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France.
Avec la participation d'AGRIFREEZ/TRINATURE, ARDO/AGORIS, BONDUELLE, CETA ENDIVES ARTOIS, ELCHAIS, Endilaon, EXPANDIS, Marché de Phalempin, Natur'coop, GREENYARD/OP Vallée de la Lys, OPLINORD, OPLVERT, Primacoop, SIPEMA, SODELEG, TY Consulting, et des producteurs observateurs.
Bulletin rédigé par les animateurs régionaux de la filière cultures légumières - Tous légumes : L. DURLIN - FREDON Hauts-de-France ; Oignon : S. DOYER -PLRN ; Chou-fleur, choux et Poireau : A. ESPINASSE - PLRN ; Salades : O. BAUDE - PLRN ; Carotte, Epinard, Pois de conserve et Haricots verts : P. MATHIEU - UNILET ; Endive : M. BENIGNI - APEF ; Céleri : R. CATTEAU - PLRN
Coordination et renseignements : Aurélie ALBAUT - Chambre d'agriculture de la Somme / Samuel BUECHE - Chambre d'Agriculture du Nord - Pas de Calais
Publication gratuite, disponible sur les sites Internet de la DRAAF et Chambre d'Agriculture des Hauts-de-France

Région Hauts-de-France