



SOMMAIRE :

• Mildiou :

-**Situation sur le terrain** : situation globalement saine pour le moment, que ce soit en parcelle ou dans l'environnement.

-**Risques** : réserve de spores potentielle hétérogène, de faible à très élevée. Météo favorable aux contaminations sur la période de mardi à jeudi. Seuil indicatif de risque atteint sur une partie des postes.

• **Pucerons** : Populations toujours importantes. Le seuil indicatif de risque est atteint sur 30% des parcelles. A surveiller.

• **Doryphores** : Populations en progression. Seuil indicatif de risque atteint dans 13% des parcelles. A surveiller.

• **Auxiliaires** : Très nombreux en parcelles, la régulation des pucerons est efficace.

• **Limaces** : activité faible



Fontaine, pleine floraison
Bailleul sir Berthoult (62)
Photo : C.HACCART—CA59/62

OBSERVATIONS : 56 parcelles ont été observées cette semaine.

SITUATION DANS LA PLAINE :

Dans le Nord et le Pas de Calais, Sur les 7 derniers jours la pluviométrie moyenne enregistrée est de 1 mm (de 0 mm à 4 mm selon les secteurs).

La plupart des parcelles entrent ou sont en phase de végétation stabilisée, les plantes sont en fleur.

La météo chaude et sèche de ces derniers jours a engendré des situations de stress hydrique et thermique dans de nombreuses parcelles, surtout dans les parcelles conduites en sec. La pousse de la végétation a été fortement freinée voire stoppée. Les différences de végétation et de grossissement des tubercules se marquent entre les parcelles irriguées et non irriguées.

On note une grande hétérogénéité en terme d'état de la végétation et de stade selon la date de plantation, le facteur irrigation, la situation pédoclimatique,...: dans certains cas les plantes sont en fleur alors qu'elles ne font qu'une trentaine de cm et sont loin de fermer le rang, dans d'autres la végétation est belle et bien développée.

Les averses orageuses prévues mercredi/jeudi devraient apporter quelques millimètres, mais qui seront bien vite effacés par le retour d'un temps chaud et sec dès la fin de semaine.

Dans les départements Picards, sur les 7 derniers jours, la pluviométrie moyenne enregistrée est de 1 mm (de 0 à 6 mm selon les secteurs géographiques). L'irrigation est utilisée déjà à plein régime dans de nombreux secteurs pour pallier au stress hydrique qui s'accroît de jours en jours. Plus précisément au niveau des observations, les parcelles sont à des stades assez hétérogènes en fonction des variétés et des cumuls hydriques reçus, elles sont comprises entre les stades « Fermeture du rang » et « Développement du fruit ». Néanmoins, une majorité des parcelles sont encore entre les stades « Floraison » et « Développement du fruit » (75 %). Les végétations sont désormais stabilisées dans la majorité des cas.

METEO :

Les prévisions météo annoncent une dégradation orageuse à compter de mercredi soir qui devrait se poursuivre par des précipitations éparpillées dans la journée de jeudi. Les températures sont en hausse mercredi pour redescendre jeudi suite aux pluies. A compter de vendredi nous devrions revenir sur une météo chaude et sèche avec des températures qui devraient augmenter crescendo durant le week-end et le début de semaine prochaine pour dépasser les 30°C l'après-midi.




Stades et de volumes de végétation très hétérogènes en Fontane, en fonction de la date de plantation, du type de sol, du contexte pédoclimatique,...



Fontane plantée le 02/05, Croissance active —Flêtre (59)
Photo : F.Delassus—CA 59/62



Fontane plantée le 25/04, Floraison. Végétation peu développée. En cours d'irrigation —Secteur Béthune
Photo : F.Delassus—CA 59/62



Fontane plantée le 19/04, Floraison, 80% de fermeture des rangs—Armbouts Cappel (59)
Photo : Chambre d'Agriculture 59/62



Brulures sur feuilles—Secteur Valenciennes
Photo : M.Becuwe—CA 59/62



Variété Innovator—Zermezele (59)
Photo : M.Bossaert



Variété Sinora—Secteur Santerre
Photo : PB.Blanchant—CA 80

Variété Ratte (Rocquemont - 60)
20 à 25 tubercules
Photo : S. Debruyne (Touquet Savour)



Variété AMANDINE (Montdidier- 80)
Tubercules issus de 5 pieds
Photo : S. Debruyne (Touquet Savour)



MILDIU :



Evolution du risque



Situation sur le terrain

Pour le moment la situation reste globalement saine, que ce soit en parcelle ou dans l'environnement (repousses sur tas de déchets non gérés, repousses en parcelles, jardins).

Seuls quelques rares cas de mildiou peu importants et peu étendus nous sont signalés cette semaine :

- Quelques taches de mildiou sporulantes sur feuille sur variété Ditta, conduite en Agriculture Biologique, dans le secteur d'Hesdin (62).
- Quelques feuilles qui présentent du mildiou sec sur variété Sinora à Buigny saint Maclou (80).



Les couples « mildiou/fluazinam », « mildiou/mandipropamide et CAA », « mildiou/oxathiapiprolin » et « mildiou/mefenoxam » sont exposés à un risque de résistance. Vous pouvez trouver toutes les informations sur les phénomènes de résistance sur le site R4p via le lien www.r4p-inra.fr/fr



Il existe des produits de biocontrôle autorisés sur le mildiou de la pomme de terre. Il s'agit de la substance active suivante : phosphonate de potassium. Retrouvez la liste actualisée des produits de biocontrôle sur le site : <https://ecophytopic.fr/reglementation/protger/liste-des-produits-de-biocontrrole>

- Les tas de déchets doivent être correctement bâchés avec une bâche noire qui couvre l'intégralité du tas et qui est bien lestée pour éviter la prise au vent. D'autres méthodes peuvent être utilisées (chaux vive, couverture du tas avec du fumier ou de la terre de déterrage), mais dans tous les cas il faut empêcher de façon durable et efficace les repousses de se développer.
- Les repousses dans les autres cultures doivent également être gérées au mieux en adaptant le désherbage de la parcelle (choix de désherbants appropriés) et en favorisant si possible le désherbage mécanique.
- Observez régulièrement vos parcelles, notamment les démarrages et croisement de rampes, fourrières, zones d'obstacle, zones basses, côté de la parcelle dans soumis aux vents dominants.



Tas de déchets non gérés proches l'un de l'autre, sans présence de mildiou (Saint Riquier-80)

Crédit photo : FREDON Hauts-de-France

DEPARTEMENTS PICARDS

Départements Picards -Tableau des risques mildiou établi à partir du modèle Mileos® le 24 juin 2025 :

	Stations météorologiques	Dates de dépassement du seuil indicateur de risque durant les 7 derniers jours	Réserve de spores potentielle	Seuil indicatif de risque atteint du 24 au 26 juin			Pluviométrie depuis le 17 juin
				Variété sensible	Variété intermédiaire	Variété résistante	
Grand Amiénois / 3 Vallées	Vron	Du 17 au 18 juin, le 20 juin & le 23 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	2,6
	Boves	Le 20 juin	Très élevée	NON	NON	NON	0
	Inval	Aucune	Faible	NON	NON	NON	0
	Thieulloy l'Abbaye	Aucune	Très élevée	OUI	NON	NON	1,2
Chaunois / Soissonnais	Coucy la Ville	Aucune	Faible	NON	NON	NON	0
	Saint Christophe à Berry	Aucune	Faible	NON	NON	NON	0
Grand Laonnois	Ebouleau	Aucune	Très élevée	NON	NON	NON	0
	Marchais	Aucune	Faible	NON	NON	NON	0
Santerre Hauts de Somme / Saint Quentin / Source et vallées	Attily	Aucune	Très élevée	OUI	NON	NON	6,5
	Templeux le Guérard	Le 17 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	2,2
	Curly	Du 17 au 20 juin & du 22 au 23 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0,8
	Aizecourt le Haut	Aucune	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0,2
Sud de l'Aisne	Verdilly	Aucune	Très élevée	OUI	OUI	NON	0
Compiègnais / Grand Beauvaisis / Thelle Vixin sablon / Sud de l'Oise	Barbery	Aucune	Très élevée	NON	NON	NON	0
	Catenoy	Les 17, 19, 21 & 23 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0,4
	Rothois	Le 23 juin	Très élevée	NON	NON	NON	0
Thierache	Grougis (Forté)	Les 17, 19 & 23 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
	Le Hérie la Vieville	Aucune	Faible	NON	NON	NON	0
Trait Vert	Attichy	Les 17, 19 & 23 juin	Très élevée	NON	NON	NON	0
	Marcelcave	Aucune	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0,6
	Vauvillers	Aucune	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1,2

Le tableau des risques mildiou est réalisé à partir de prévisions météorologiques à 48 heures. Si les conditions météorologiques constatées diffèrent des prévisions (pluies, brumes, brouillard...) il se peut que les risques évoluent.

Départements Picards - Situation au niveau de Mileos® et analyse des risques du 24 au 26 juin :

SITUATION AU NIVEAU DE MILEOS®

Des contaminations ont été enregistrées ponctuellement la semaine dernière sur quelques postes, mais globalement le risque mildiou est resté faible.

Sur certains postes, les potentiels de sporulation sont importants, signifiant ainsi que le seuil indicatif de risque peut être atteint sur toutes les variétés dès lors que la météo est favorable au développement du mildiou (notamment à partir de jeudi au vu des orages prévus dans la nuit de mercredi à jeudi).

ANALYSE DES RISQUES

-Le seuil indicatif de risque devrait être atteint A COMPTER de DEMAIN sur variétés sensibles sur le poste de Thieulloy l'Abbaye.

-Le seuil indicatif de risque devrait être atteint A COMPTER de DEMAIN sur variétés sensibles, intermédiaires et résistantes sur les postes de Aizecourt le Haut, Attichy, Curly, Marcelcave, Templeux le Guérard et Vron.

-Le seuil indicatif de risque devrait être atteint A COMPTER de JEUDI sur variétés sensibles uniquement sur le poste de Attily.

-Le seuil indicatif de risque devrait être atteint A COMPTER de JEUDI sur variétés sensibles ET intermédiaires sur le poste de Verdilly.

-Le seuil indicatif de risque devrait être atteint A COMPTER de JEUDI sur variétés sensibles, intermédiaires et résistantes sur les postes de Catenoy, Grougis (Forte).

☒ Utiliser en priorité des moyens de lutte alternatifs aux traitements conventionnels, des méthodes biologiques ou des solutions de biocontrôle autorisées. En cas de nécessité d'intervention chimique de synthèse, privilégier les produits présentant le plus faible risque pour la santé et l'environnement.

- Le seuil indicatif n'est pas atteint quelle que soit la variété pour tous les autres postes.

☒ Sur la base des observations réalisées sur les seules parcelles du réseau d'épidémiosurveillance, l'évaluation du risque pour ce bioagresseur indique qu'aucune intervention n'est nécessaire à ce stade. Une observation directe de vos propres parcelles vous permettra de confirmer ou non cette évaluation du risque.

DEPARTEMENTS NORD et PAS DE CALAIS

Nord et Pas De Calais -Tableau des risques mildiou établi à partir du modèle Mileos® le 24 juin 2025 :

	Stations météorologiques	Dates de dépassement du seuil indicateur de risque durant les 7 derniers jours	Réserve de spores potentielle	Seuil indicateur de risque atteint du 24 au 26 juin			Pluviométrie depuis le 17 juin
				Variété sensible	Variété intermédiaire	Variété résistante	
Scarpe / Hainaut / Cambrésis/Thiérache	Avesne les Aubert	Les 17 et 23 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	
	Esnes	Aucune	Faible	NON	NON	NON	0
	Fressies	Le 17 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
	Ohain	Aucune	Faible	NON	NON	NON	0
	Thiant	Aucune	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
Artois / Ternois / Pays de Montreuil	Ambricourt	Les 18 et 23 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
	Aix Noulette	Les 17, 19 et 23 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
	Berles au Bois	Le 23 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
	Bonnières	Les 17, 18 et 23 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	2
	Boursies	Aucune	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
	Croisette	Les 18 et 23 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	2
	Ecures	Du 17 au 20 et le 23 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
	Gomiecourt	Du 17 au 19 et les 22 et 23 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
	Haucourt	Aucune	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
	Hermaville	Aucune	Très élevée	OUI	OUI	OUI	3
	Izel-les-Equerchin	Aucune	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
	Saint Pol sur Ternoise	Les 18 et 23 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	2
	Ternas	Les 18, 19 et 23 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	3
	Tilloy Les Mofflaines	Aucune	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
Bethunois / Plaine de la Lys / Pays d'Alre	Auchy les Mines	Aucune	Faible	NON	NON	NON	0
	Calonne Sur La Lys	Le 17 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
	Hesdigneul Les Béthune	Aucune	Faible	NON	NON	NON	1
	Lillers	Aucune	Faible	NON	NON	NON	0
	Lorgies	Aucune	Faible	NON	NON	NON	2
	Mametz	Aucune	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
Région de Lille / pévèle	Allesnes les Marais	Aucune	Faible	NON	NON	NON	1
	Frelinghien	Aucune	Faible	NON	NON	NON	1
	Orchies	Aucune	Faible	NON	NON	NON	0
Flandres / Wateringues / Collines guinoises	Andres	Les 18, 20 et 23 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
	Bailleul	Aucune	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
	Caestre	Aucune	Faible	NON	NON	NON	3
	Hondschoote	Aucune	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
	Merckeghem	Aucune	Faible	NON	NON	NON	0
	Pitgam	Du 17 au 20 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
	Steenbecque	Le 17 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
	Teteghem	Du 18 au 20 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
	Vieille Eglise	Du 17 au 23 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
	Wormhout	Les 18 et 20 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	4
	Zuytpeene	Le 18 juin	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0

Le tableau des risques mildiou est réalisé à partir de prévisions météorologiques à 48 heures. Si les conditions météorologiques constatées diffèrent des prévisions (pluies, brumes, brouillard...) il se peut que les risques évoluent.

HAUTS DE France - Situation au niveau de Mileos® et analyse des risques du 24 au 26 juin :

ANALYSE DES RISQUES

Comme annoncé dans le BSV de mardi dernier, sur la majorité des secteurs les conditions climatiques chaudes (voire très chaudes) et sèches n'ont pas été favorables au mildiou sur la période du 17 au 22 juin.

Cependant, sur quelques postes, notamment **en bordure maritime et dans le Ternois**, l'hygrométrie nocturne et matinale élevée sur de longues plages a entraîné l'enregistrement de contaminations théoriques ponctuelles au niveau de Miléos. Néanmoins, les températures élevées en journée couplées à un environnement sain ont limité le risque mildiou.

Hier, les conditions météorologiques matinales localement humides (pluie, crachin, hygrométrie élevée) **ont été favorables au mildiou sur une partie des postes** (bordure maritime et Ternois principalement) avec pour conséquence un seuil indicatif de risques qui a été atteint (*voir le détail poste par poste en 3ème colonne du tableau des risques mildiou*).

La réserve de spores potentielle est très hétérogène selon les postes avec deux situations :

- **Sur les postes où aucune contamination n'a été enregistrée depuis au moins 10 jours**, la réserve de spores potentielle est en baisse, elle est revenue à un **niveau faible**. Il faudra qu'une nouvelle contamination ait lieu pour qu'elle augmente de nouveau au bout de 5 à 7 jours : Il n'y a donc pas risque immédiat, même en cas de météo favorable au mildiou
- **Sur les postes où des contaminations ont été enregistrées ces derniers jours, la réserve de spore potentielle est alimentée et se maintient à un niveau Très élevé.**

► *Pour rappel, il faut que la réserve de spores soit au minimum à un niveau « moyen » et que les conditions météorologiques soient favorables au mildiou pour que le seuil indicatif de risque soit atteint (voir explications détaillées en page 3).*

► *Lorsque la réserve de spores est « moyenne » à « très élevée », dès lors que la météo est favorable au mildiou des contaminations peuvent avoir lieu et le seuil indicatif de risque peut être atteint.*

-Aujourd'hui, MARDI, les conditions météo ne sont globalement pas favorables au mildiou.

-MERCREDI, suite à une hygrométrie nocturne et matinale localement élevée, le seuil indicatif pourrait être atteint sur tous les postes où la réserve de spores potentielle est suffisante.

-JEUDI, si les averses orageuses et les précipitations annoncées pour la nuit et en journées se confirment, les conditions seront très favorables au mildiou et aux contaminations. Le seuil indicatif pourra être atteint sur tous les postes où la réserve de spores potentielle est suffisante.

- A compter de vendredi, les températures devraient augmenter et le temps revenir au sec. Le risque mildiou devrait être moindre : seuil indicatif non atteint ou atteint très localement et ponctuellement.

SITUATION AU NIVEAU DE MILEOS®

Les parcelles sont pour la plupart entre les stades « croissance active » et « végétation stabilisée ». La pousse de la végétation a été fortement ralentie voire stoppée par les conditions chaudes et sèches.

Pour le moment, les parcelles sont globalement saines et l'environnement (tas de déchets non gérés, repousses, jardins de particuliers) est sain également.

-Le seuil indicatif de risque n'est pas atteint sur la période du 24 au 26 juin sur les postes de Esnes, Ohain, Auchy Les Mines, Hesdigneul Les Bethune, Lillers, Lorgies, Allessnes Les Marais, Frelinghien, Orchies, Caestre et Merckeghem.

☒ *Sur la base des observations réalisées sur les seules parcelles du réseau d'épidémiosurveillance, l'évaluation du risque pour ce bioagresseur indique qu'aucune intervention n'est nécessaire à ce stade. Une observation directe de vos propres parcelles vous permettra de confirmer ou non cette évaluation du risque.*

-Le seuil indicatif de risque est atteint ce MARDI et devrait être atteint MERCREDI ET JEUDI sur variétés sensibles, intermédiaires et résistantes sur le poste d'Ecuire.

-Le seuil indicatif de risque devrait être atteint MERCREDI ET JEUDI sur variétés sensibles, intermédiaires et résistantes sur TOUS LES AUTRES POSTES

☒ *Utiliser en priorité des moyens de lutte alternatifs aux traitements conventionnels, des méthodes biologiques ou des solutions de biocontrôle autorisées. En cas de nécessité d'intervention chimique de synthèse, privilégier les produits présentant le plus faible risque pour la santé et l'environnement.*

► **A compter de vendredi et jusqu'en début de semaine prochaine, si les conditions météo chaudes et sèches se confirment le seuil indicatif de risques ne devrait pas être atteint (ou très localement et ponctuellement).**

DORYPHORES



Evolution du risque



SEUIL INDICATIF DE RISQUE :

- Deux foyers de doryphores pour 1000m² (un foyer = 2 à 3 pieds avec présence de larves).
- Ou nombreuses larves et adultes disséminés dans la parcelle
- Ou 5% de feuillage détruit

45 parcelles ont fait l'objet d'observations cette semaine.

On note une augmentation du nombre de parcelles avec présence de larves. La présence des larves devrait s'intensifier dans les prochains jours et les prochaines semaines car des éclosions sont visibles dans de nombreuses parcelles et vont donner naissance à des larves. A noter également le nombre de pontes présentes sur feuillage, présage que l'insecte sera présent tout au long du cycle de la végétation.


► **Au sein du réseau, le seuil indicatif de risque est atteint dans 13% des parcelles contre 5% la semaine dernière.**

► **Observez attentivement vos parcelles pour surveiller la présence et l'évolution des populations.**



Doryphore adulte (Gentelles 80)

Crédit photo : FREDON Hauts-de-France



Ponte de doryphore (Flêtre - 59)
Crédit photo : F. Delassus CA 59/62



Foyer larves doryphores (Gavrelle - 62)
Crédit photo : C. Haccart CA 59/62



Foyer larves doryphores (Gentelles 80)
Crédit photo : FREDON Hauts-de-France

PUCERONS




Evolution du risque

SEUIL INDICATIF DE RISQUE :

- 50% des folioles porteuses de pucerons.
- Ou 5 à 10 pucerons par feuille

1 - Le dispositif de piégeage :

Les captures de pucerons ailés ont diminué cette semaine de **487 à 119** individus. La températures très élevées de samedi dernier et le manque d'humidité semblent déplaire aux pucerons. L'espèce *Myzus persicae* (60%) est majoritaire.




Pucerons aptères et ailés - Secteur Saint Quentin - 02)

Crédit photo : J. Aldebert - AgroPomConseil

2 - En végétation, 40 parcelles ont fait l'objet d'observation.

C'est le ravageur qui fait parler de lui depuis ces 3 dernières semaines. La pression pucerons, en végétation, continue d'être importante.

Pour imager la pression, sur 2 parcelles, situées dans les secteurs de l'Artois et Saint Quentinois, la présence des pucerons est telle (60 pucerons/feuille en moyenne) que le feuillage en est rendu brillant par la présence de miellat. Nous pouvons observer que les pucerons présents sont un peu moins agités, abasourdis par la chaleur, mais ils sont toujours aussi nombreux !



► Le seuil indicatif de risque est atteint dans 30 % des parcelles.

► Poursuivez les observations et les comptages. Les colonies sont surtout présentes sur les feuilles du bas (cf méthodologie page suivante).

► Les auxiliaires s'installent, ils contribuent à réduire les populations.

*Sont considérées uniquement les parcelles qui n'ont pas reçu de traitement insecticide pour estimer l'évolution naturelle des populations.

Parcelle envahie de pucerons, avec présence de larves de coccinelle.
Présence de miellat sur feuillage (feuillage brillant et collant) - Secteur Artois (62)
Crédit photo : C. Haccart CA 59/62



LES AUXILIAIRES

C'est un festival d'auxiliaires dans les parcelles. Tous se sont installés et développés en végétation et ils jouent bien leur rôle. **Il est essentiel de les préserver.** Nous pouvons observer tous les stades du cycle de vie des auxiliaires.

Selon les 36 parcelles observées, les coccinelles sont les premières sur le podium (100% des parcelles), suivies par les syrphes et les hyménoptères et enfin les chrysopes.

Nous vous rappelons l'intérêt de mettre en place le comptage INDICE auxiliaires. Il permet de mesurer l'efficacité des auxiliaires sur les pucerons et de raisonner les interventions insecticides sur vos parcelles. **ATTENTION : Cet indice s'adresse UNIQUEMENT aux variétés peu sensibles aux viroses**



Coccinelle adulte (Département 80)
Crédit photo : S. Debryune (Touquet Savour)



Œufs et éclosion larves coccinelle (Chemy - 59)
Crédit photo : C. Haccart



Larves et imago de coccinelles (Marcelcave - 80)
Crédit photo : FREDON Hauts-de-France



Syrphe adulte *Syrphid pipiens* (Gentelles - 80)
Crédit photo : FREDON HdF



Syrphe adulte (Rocquemont)
Photo : S. Debryune (Touquet Savour)



Larve de syrphe (Erin - 62)
Crédit photo : C. Haccart CA 59/62



Pupe de syrphe (Bailleul sir Berthoult - 62)
Crédit photo : C. Haccart CA 59/62



Œuf de chrysope (Gentelles - 80)
Crédit photo : FREDON Hauts-de-France




Pucerons parasités (Flêtre - 59)
Crédit photo : F. Delassus CA 59/62



Pucerons parasités (Bailleul sir Berthoult - 62)
Crédit photo : C. Haccart CA 59/62

Réaliser le comptage INDICE auxiliaires dans vos parcelles

LIMACES :



RAPPEL SEUIL INDICATIF DE RISQUE :

4 limaces par m² (piégeage réalisé à l'aide de 4 pièges pour une surface totale de 1m²)

Le réseau de l'observatoire anti-limaces est un réseau de piégeage des limaces mis en place depuis plusieurs années en partenariat avec McCain, les Ets Pomuni, les Ets Carré et la Chambre d'Agriculture du Nord Pas de Calais.

Le réseau de piégeage 2025 est composé de **20 parcelles présentant pour la plupart un risque limace avéré.**

Les relevés des pièges sont réalisés chaque lundi par les agriculteurs eux mêmes selon un protocole harmonisé.

Après un premier piégeage T0 avant la plantation qui avait montré un risque limace faible (18% des parcelles avec présence de limaces, 0.2 limaces/m² en moyenne), les piégeages reprennent cette semaine dans les parcelles qui ont atteint le stade de 50% de couverture du rang.

Concernant l'activité des limaces au 22 juin :



13 parcelles ont fait l'objet d'un piégeage cette semaine.

- Aucune limace n'a été piégée.

► La pression sur les parcelles du réseau est faible, les conditions climatiques chaudes et sèches actuelles ne sont pas favorables à l'activité des limaces.



Dispositif de piégeage placé entre les buttes
Photo : C.Haccart — Ca 59/62



Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'écologie, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018 et celui du Conseil Régional Hauts-de-France.

Rédactrice et animatrice filière pour le secteur Nord-Pas de Calais : Christine Haccart - Chambre d'Agriculture du Nord Pas de Calais (Tél : 06.74.35.36.52)

Animateurs filière pour le secteur Picardie : Valérie Pinchon - FREDON Hauts de France (Tél : 03.22.33.67.11) et Pierre-Baptiste Blanchant—Chambre d'Agriculture de la Somme (Tél : 03.22.95.51.20)

Expertise Miléos : Arvalis Institut du Végétal

Bulletin édité sur la base des observations réalisées par les partenaires du réseau : Arvalis Institut du Végétal, AgroPomConseil, Asel, M.Bossaert A2D, Céré-sia, Campus agro environnemental 62, CETA de Ham, GR CETA du Soissonnais, CETA des Hauts de Somme, Chambre d'Agriculture de la Somme, Chambre d'Agriculture du Nord Pas de Calais, Chambre d'Agriculture de l'Oise, Comité Nord, Coopérative de Vecquemont, Ducroquet Négoce, Expandis, Ets Charpentier, Coopérative la Flandre, FREDON Hauts-de-France, Le GAPPI, GC la Pomme de Terre, GITEP, Intersnack, IPM France, Ets Jourdain, Mc Cain, Nord Négoce, Pomuni France, Pom'Alliance, Réseau Vitalis, Sana Terra, Select'up, le SETAB, Soufflet Agriculture, Terre de France, TERNOVEO, Touquet Savour, UNEAL, Ets Vaesken.

Ferme des Tilleuls, M Debarge, GAEC Fourdinier, M Henno, M Ruysen, M Caby, M Lefranc, M Gosse de Gorre, M Cannesson, M Dequeker, M Dequidt, M Clay.

Coordination et renseignements : Samuel Bueche - Chambre d'Agriculture du Nord Pas de Calais (Tél: 03.21.60.57.60) et Aurélie Albaut - Chambre d'Agriculture de la Somme (Tél : 03 22 85 32 11).

